



Math-Net.Ru

All Russian mathematical portal

N. M. Babayan, An asymptotic behaviour of the prediction error, *Zap. Nauchn. Sem. LOMI*, 1983, Volume 130, 11–24

Use of the all-Russian mathematical portal Math-Net.Ru implies that you have read and agreed to these terms of use
<http://www.mathnet.ru/eng/agreement>

Download details:

IP: 18.97.14.85

January 18, 2025, 10:52:39



ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ ОШИБКИ ПРОГНОЗА

I. Введение

В данной работе рассматривается задача линейного прогнозирования стационарного в широком смысле случайного процесса с дискретным временем в сингулярном случае. Исследуется асимптотическое поведение ошибки наилучшего линейного прогноза, когда длина интервала, по которому ведется прогнозирование, стремится к бесконечности. Установлена связь между экспоненциальной скоростью убывания к нулю ошибки прогноза и емкостью (трансфинитным диаметром) множества всех тех точек, в которых спектральная плотность процесса строго положительна.

Итак, пусть $\{X_n\}_{-\infty}^{\infty}$ — стационарный в широком смысле случайный процесс с дискретным временем, т. е. $\{X_n\}$ — последовательность случайных величин с одним и тем же средним m (мы будем полагать что $m = 0$) и корреляционной функцией

$$K(n, m) = E X_n \bar{X}_m = K(n - m),$$

зависящей лишь от разности $n - m$ (предполагается, конечно, что $E |X_n|^2 < \infty$).

Обозначим через H линейную оболочку величин X_k , $-\infty < k < \infty$, замкнутую относительно сходимости в среднем квадратичном. Введением для величин X и Y из H скалярного произведения $(X, Y) = E X \bar{Y}$ H превращается в гильбертово пространство. Мы предполагаем, что процесс X_n имеет спектральную плотность (с.п.) $f(\lambda)$.

Обозначим через $\hat{\sigma}_n$ ошибку наилучшего линейного прогноза величины X_0 по прошлому длины n , т. е. по величинам $X_{-1}, X_{-2}, \dots, X_{-n}$:

$$\hat{\sigma}_n^2 = \min_{X \in H_{-n}^{-1}} \|X_0 - X\|^2 = \min_{C_k} \|X_0 - \sum C_k X_{-k}\|^2,$$

где H_{-n}^{-1} — линейная оболочка величин X_k , $-n \leq k \leq -1$. Ошибку прогноза по всему прошлому обозначим через $\hat{\sigma}_\infty$:

$$\hat{\sigma}_\infty^2 = \min_{X \in H_{-\infty}^{-1}} \|X_0 - X\|^2,$$

где $H_{-\infty}^{-1}$ — замкнутая линейная оболочка величин X_k , $k < 0$.

Известно (см., например, [8], стр. 62), что

$$\hat{\sigma}_\infty^2 = 2\pi \exp \left\{ \frac{1}{2\pi} \int \ln f(\lambda) d\lambda \right\}$$

(здесь и далее, где не указаны пределы, интегрирование произво-

дится от $-\mathcal{T}$ до \mathcal{T}), и в зависимости от того, сходится интеграл под знаком экспоненты или он равен $-\infty$, ошибка прогноза δ_∞ по всему прошлому будет равна нулю (сингулярный процесс) или больше нуля (регулярный процесс).

Положим $\delta_n = \delta_n^2 - \delta_\infty^2$. Очевидно $\delta_n \geq 0$ и $\delta_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Нас интересует скорость стремления к нулю величины δ_n . Асимптотическое при n стремящемся к бесконечности поведение δ_n в случае регулярного процесса достаточно хорошо изучено [5] - [8], [12]. В частности, теорема I И.А.Ибрагимова [5] дает необходимые и достаточные условия для того, чтобы

$$\delta_n = O(n^{-\gamma}), \quad \gamma > 1, \quad n \rightarrow \infty.$$

Гренандер и Розенблатт нашли необходимое и достаточное условие, которое, будучи наложено на с.п. $f(\lambda)$, гарантирует, что

$$\delta_n = O(e^{-cn}), \quad c > 0, \quad n \rightarrow \infty \quad ([7], [8], \text{стр.238}).$$

Все эти результаты относятся к регулярному случаю. Что же касается сингулярного случая, то нам известна лишь одна работа [I] Розенблатта, содержащая следующий результат: если с.п. $f(\lambda)$ непрерывна и строго положительна на отрезке $[\frac{\mathcal{T}}{2} - d, \frac{\mathcal{T}}{2} + d]$ и равна нулю вне него, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\delta_n(f)} = \sin \frac{d}{2}. \quad (I)$$

Таким образом, если с.п. обращается в нуль на целом отрезочке, то ошибка прогноза δ_n убывает к нулю с экспоненциальной скоростью.

Настоящая работа также посвящена изучению асимптотики ошибки прогноза сингулярного процесса.

2. Формулировка основных результатов.

Прежде чем сформулировать наши результаты, напомним коротко определение емкости или трансфинитного диаметра.

Пусть F - ограниченное замкнутое множество на плоскости комплексного переменного Z , $T_n(Z, F) = Z^n + a_1^{(n)} Z^{n-1} + \dots$ - многочлен Чебышева, наименее уклоняющийся от нуля на множестве F в равномерной метрике и $m_n(F) = \max_{Z \in F} |T_n(Z, F)|$. Тогда, как известно (см., например, [9]), существует предел последовательности чисел $[m_n(F)]^{1/n}$, который называется емкостью или трансфинитным диаметром множества F , $\tau(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} [m_n(F)]^{1/n}$.

Для произвольного (не обязательно замкнутого) ограниченно-го множества E вводятся [3] внутренняя емкость $\tau_*(E)$:

$$\tau_*(E) = \sup_{F \subset E} \tau(F),$$

где точная верхняя грань берется по всем замкнутым подмножествам F множества E , и внешняя емкость $\tau^*(E)$:

$$\tau^*(E) = \tau(\bar{E}),$$

где \bar{E} - означает замыкание E .

Очевидно $\tau_*(E) \leq \tau^*(E)$ и если в этом неравенстве имеет место равенство, то соответствующее множество E будем называть τ -измеримым.

Обозначим через E спектр с.п. $f(\lambda)$, т.е. множество точек, в которых с.п. $f(\lambda)$ строго положительна, причем в дальнейшем нам удобнее будет считать, что с.п. задана на единичной окружности (отрезке $[-\pi, \pi]$ с отождествленными концами) C и, следовательно, $E \subset C$.

ТЕОРЕМА I. Имеют место следующие утверждения:

а)
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sigma_n(E)} \leq \tau^*(E),$$

т.е. для того, чтобы ошибка прогноза σ_n сингулярной стационарной последовательности убывала по крайней мере экспоненциально, когда n стремится к бесконечности, достаточно, чтобы внешняя емкость спектра с.п. $f(\lambda)$ была меньше единицы.

б) Если E - является объединением конечного числа дуг единичной окружности, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sigma_n(E)} = \tau(E) \quad (2)$$

в) Соотношение (2) остается в силе, если E состоит из объединения счетного числа дуг и τ -измеримо.

Для формулировки теоремы 2 напомним определение точки Лебега.

Пусть $F \subset C$. Точка $x \in F$ называется точкой Лебега множества F , если

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{m(D_\delta(x) \cap F)}{2\delta} \rightarrow 1,$$

где $D_\delta(x)$ - круг радиуса δ с центром в точке x , а $m(e)$, $e \subset C$ - линейная мера множества e .

Пусть E имеет тот же смысл, что и в теореме I, а N - множество точек Лебега множества E .

ТЕОРЕМА 2. Если на окружности C существует такое замкнутое множество F , состоящее из объединения счетного числа дуг, что $E \subset F$ и $\tau(N) = \tau(E) = \tau(F)$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sigma_n(E)} = \tau(E).$$

3. Вспомогательные результаты

Напомним теперь другое определение емкости, эквивалентность которого с предыдущим была установлена Сеге (см., например, [9], стр. 302). Пусть F - замкнутое ограниченное множество плоскости комплексного переменного и D - та из дополнительных к F областей, которая содержит точку $z = \infty$. Если граница $\Gamma = \partial D$ области D состоит из конечного числа жордановых кривых, то существует функция Грина $G_D(z, \infty)$ области D , гармоничная всюду в области D , кроме точки $z = \infty$, непрерывная, включая границу Γ , и на Γ равная нулю, а в окрестности же точки $z = \infty$ она имеет представление

$$G(z, \infty) = \ln |z| + u(z),$$

где $u(z)$ - гармоническая функция в окрестности точки $z = \infty$, значение которой в этой точке называют постоянной Робэна,

$\gamma = u(\infty)$. Число $\tau(F) = e^{-\gamma}$ называется емкостью множества F .

Если граница Γ не удовлетворяет ранее наложенным условиям, то функцию Грина области D определяют следующим образом: пусть $D_1 \subset D_2 \subset D_3 \subset \dots$ - последовательность областей, ограниченных конечным числом жордановых кривых, содержащихся вместе с границами в области D и исчерпывающих ее. Последнее означает, что $D_n \subset D_{n+1}$, $\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n = D$. Пусть $G_n(z, \infty)$ - функция

Грина области D_n . Последовательность гармонических функций

$G_n(z, \infty) = \ln |z| + u_n(z)$ монотонно возрастает в области D и, поэтому, сходится равномерно на каждом замкнутом подмножестве множества D к $+\infty$ или к гармонической функции $G(z)$. В этом последнем случае функцию

$$G(z) = \ln |z| + u(z),$$

где $u(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(z)$ называют функцией Грина области D , число $\gamma = u(\infty)$ - постоянной Робэна этой области, а число $\tau(F) = e^{-\gamma}$ емкостью множества F .

Как отмечалось выше, это определение емкости ограниченного замкнутого множества плоскости комплексного переменного эквива-

лентно предыдущему определению, приведенному в пункте 2.

Таким образом, каждому ограниченному замкнутому множеству F с $\tau(F) > 0$ соответствует функция $G_F(z)$ - функция Грина той из дополнительных к F областей D_F , которая содержит бесконечно удаленную точку.

Произвольному (не обязательно замкнутому) ограниченному множеству E с $\tau_*(E) > 0$ сопоставим, следуя П.П.Коровкину, функцию

$$G_E(z) = \inf_{F \subset E} G_F(z), \quad z \in D_{\bar{E}}$$

Отметим некоторые свойства емкости.

1. Если $F_1 \subset F_2$, то $\tau(F_1) \leq \tau(F_2)$, т.е. емкость монотонно возрастает вместе с аргументом (это очевидно).
2. Емкость окружности равна ее радиусу (см. [9], стр.289).
3. Емкость дуги длиной 2α единичной окружности равна $\sin \frac{\alpha}{2}$ (см. [1]).
4. Емкость замкнутого отрезка равна четверти его длины (см. [9], стр.290).
5. Если $F_1 \subset F_2$ и $\tau(F_1 \cup F_2) > 0$, то

$$\frac{\tau(F_1)}{\tau(F_1 \cup F_2)} \leq \frac{\tau(F_2)}{\tau(F_2 \cup F_1)} \quad (\text{см. [3]}).$$

6. Если F^* - множество всех точек Z , таких, что $P_n(Z) \in F$, где $P_n(Z) = Z^n + \dots + C_n$ - произвольный многочлен степени n , то

$$\tau(F^*) = [\tau(F)]^{\frac{1}{n}} \quad (\text{см. [9], стр.290}).$$

7. Если F_l - проекция множества F на прямую l , то линейная мера множества F_l не превосходит $4\tau(F)$ (см. [9], стр.294).

8. Если множество F_1 получается из множества F линейным преобразованием $z_1 = az + b$, $z \in F$, то

$$\tau(F_1) = |a|\tau(F) \quad (\text{см. [3]}).$$

ЗАМЕЧАНИЕ I. Из свойства 7 емкости следует, что если емкость линейного множества равна нулю, то и мера его также равна нулю. Однако, существуют линейные множества нулевой меры, но положительной емкости (см. [3]).

ЛЕММА I. На единичной окружности существует τ -измеримое множество меры нуль, емкость которого равна емкости окружности.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть F - подмножество единичной окружности с нулевой мерой и положительной емкостью (см. замечание I). Положим

$$F_n = \{z : z^n \in F\}$$

Тогда в силу свойства 6 емкости

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tau(F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} [\tau(F)]^{\frac{1}{n}} = 1.$$

Множество $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ будет искомым, так как

$$\tau_*(E) = \sup_{F \subset E} \tau(F) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \tau(F_n) = 1,$$

а с другой стороны E является подмножеством окружности, и, следовательно, $\tau^*(E) \leq 1$.

ЛЕММА 2 [3]. Если $F_1 \subset F_2 \subset F_3 \subset \dots$ - последовательность замкнутых множеств и $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ - ограниченное множество, то

$$\tau_*(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tau(F_n).$$

ЛЕММА 3. Если $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$ - последовательность τ -измеримых множеств и $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ - ограниченное множество, то

$$\tau_*(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tau(E_n).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Очевидно,

$$\tau(E_n) \leq \tau_*(E),$$

(т.к. $E_n \subset E$) и, следовательно,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \tau(E_n) \leq \tau_*(E).$$

Чтобы доказать обратное неравенство для нижнего предела, зададим произвольное $\delta > 0$ и выберем замкнутое множество $F \subset E$ такое, что $\tau(F) > \tau_*(E) - \delta$. Положим $F_n = F \cap \bar{E}_n$. Тогда замкнутые множества F_n образуют возрастающую последовательность и $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = F$. Поэтому согласно лемме 2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tau(F_n) = \tau(F).$$

Так как множества E_n τ -измеримы, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tau(E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tau(\bar{E}_n) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \tau(F_n) = \tau(F) > \tau_*(E) - \delta,$$

откуда, ввиду произвольности δ , вытекает утверждение леммы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Точку z будем называть, следуя П.П.Коровкину [3], точкой накопления множества E , если расходитс я ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \tau_*(E_n),$$

где E_n - общая часть множества E и кольца $\frac{1}{2^n} \leq |z-x| < \frac{1}{2^{n-1}}$.

ЛЕММА 4 [3]. Если каждая точка множества M является точкой накопления множества E , то $\tau_*(E) \geq \tau_*(M)$.

Если E состоит из нескольких открытых дуг окружности, то, используя свойство 3 емкости, легко показать, что каждая точка \bar{E} является точкой накопления E и, стало быть

$$\tau_*(E) \geq \tau(\bar{E}) = \tau^*(E), \text{ т.е. множество } E \text{ - } \tau\text{-измеримо.}$$

ЛЕММА 5 [3]. Если каждая точка множества E является его точкой Лебега и $E_n \subset E$, $m(E - E_n) \rightarrow 0$, то

$$\tau_*(E_n) \rightarrow \tau_*(E).$$

ЛЕММА 6 [3]. Пусть замкнутое ограниченное множество F состоит из счетного числа спрямляемых кривых. Тогда для любого множества $M \subset F$, для которого существует такая точка $z_M \in F$, что

$$G_M(z_M, \infty) \geq \lambda > 0,$$

справедливо неравенство

$$\tau(F) - \tau_*(M) \geq \delta = \delta(\lambda) > 0.$$

СЛЕДСТВИЕ I. Пусть F удовлетворяет условиям леммы 6, $E \subset F$ состоит из точек Лебега, τ -измеримо и $\tau(E) = \tau(F)$. Тогда для любого множества $M \subset E$ для которого существует точка $z \in F$, такая, что

$$G_M(z, \infty) \geq \lambda > 0,$$

справедливо неравенство

$$m(E) - m(M) \geq \delta = \delta(\lambda) > 0.$$

Действительно, из леммы 6 следует, что

$$\tau(F) - \tau_*(M) = \tau(E) - \tau_*(M) \geq \delta = \delta(\lambda) > 0.$$

Но тогда согласно лемме 5

$$m(E \setminus M) \geq \delta = \delta(\delta) = \delta(\lambda) > 0.$$

ЛЕММА 7 [10]. Пусть D - область, содержащая точку

$z = \infty$, а $P_n(z)$ - многочлен степени n . Тогда, если

$$|P_n(x)| \leq M, \quad x \in \Gamma = \partial D,$$

то

$$|P_n(z)| \leq M e^{nG_D(z, \infty)}$$

4. Доказательство теорем I, 2.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ I. Известно, (см., например, [II]), что соответствие

$$X_n \longleftrightarrow e^{in\lambda}$$

продолжается до изометрии пространств H и $L^2_{\mathfrak{f}} = L^2(\mathfrak{f} d\lambda, [\mathfrak{F}, \mathfrak{F}])$. В силу этой изометрии ошибку прогноза b_n можно представить в виде:

$$b_n^2 = \min_{C_n} \int \left| 1 - \sum_{k=1}^n c_k e^{-ik\lambda} \right|^2 \mathfrak{f}(\lambda) d\lambda = \min_{q_n \in \mathfrak{F}_n} \int |q_n(e^{i\lambda})|^2 \mathfrak{f}(\lambda) d\lambda, \quad (3)$$

где \mathfrak{F}_n - класс многочленов степени n с единичными старшими коэффициентами.

Введем для удобства меру μ на C :

$$\mu(e) = \int \mathfrak{f} dm, \quad e \in C.$$

Тогда

$$b_n^2 = \min_{q_n \in \mathfrak{F}_n} \int_E |q_n(z)|^2 d\mu = \int_E |P_n(z, E)|^2 d\mu, \quad (4)$$

где $P_n(z, E)$ - сам минимизирующий многочлен, а E множество точек C в которых с.п. $\mathfrak{f}(\lambda)$ строго положительна.

Из соотношения (4) следует, что

$$b_n^2(E) \leq \int_E |T_n(z, \bar{E})|^2 d\mu \leq \text{const } m_n^2(\bar{E}),$$

откуда, извлекая корень и переходя к пределу при n стремящемся к бесконечности, получаем утверждение а) теоремы I.

Идея доказательства пункта б) принадлежит Я.Л.Геронимусу [2] и опирается на следующий результат Мазуркевича [4].

ЛЕММА 8 [4]. Всякому $\varepsilon > 0$ соответствует такое $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ (зависящее только от ε), что для всякого континуума Γ диаметра d и всякого замкнутого его подмножества F выполняется неравенство

$$M_n = \max_{z \in \Gamma} |q_n(z)| \leq (1+\delta)^n \max_{z \in F} |q_n(z)|, \quad (5)$$

если только $m(\Gamma \setminus F) < \delta d$, а $q_n(z)$ - многочлен степени n .

Из леммы 8 вытекает

СЛЕДСТВИЕ 2. Пусть Γ состоит из объединения конечного числа континуумов. Тогда всякому $\delta > 0$ соответствует такое $\delta = \delta(\Gamma, \delta) > 0$ (зависящее только от Γ и δ), что для всякого замкнутого множества $F \subset \Gamma$ и всякого многочлена $p_n(z)$ степени n выполняется неравенство (5), если только $m(\Gamma \setminus F) < \delta$.

Перейдем к доказательству пункта б) теоремы I.

В силу неравенства пункта а) достаточно показать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\bar{\sigma}_n(E)} \geq \tau(E). \quad (6)$$

Для этого рассмотрим те подмножества $e_n \subset E$, для которых выполняются неравенства

$$|p_n(z)| > \sqrt{\bar{\sigma}_n m_n(E)}, \quad z \in e_n.$$

Так как

$$\mu(e_n) \leq \mu(E) < +\infty,$$

то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\mu(e_n)} \leq 1.$$

Зададим $\lambda > 0$ и обозначим через $\{d_i\}$ те значения n , для которых выполняются неравенства

$$\mu(e_n) > (1-\lambda)^n. \quad (7)$$

Для остальных значений n , которые мы обозначим $\{\beta_j\}$, имеем:

$$\mu(e_n) \leq (1-\lambda)^n. \quad (8)$$

Далее,

$$\bar{\sigma}_{d_i}^2 = \int_E |p_{d_i}(z)|^2 d\mu \geq \int_{e_{d_i}} |p_{d_i}(z)|^2 d\mu \geq \bar{\sigma}_{d_i} m_{d_i}(E) \mu(E_{d_i})$$

откуда, благодаря (7), получаем

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \sqrt[d_i]{\bar{\sigma}_{d_i}} \geq (1-\lambda) \tau(E). \quad (9)$$

С другой стороны, при $z \in F_j = E \setminus e_{\beta_j}$ имеем

$$|P_{\beta_j}(z)| \leq \sqrt{\sigma_{\beta_j} m_{\beta_j}(E)},$$

причем из неравенства (8) следует, что

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \mu(e_{\beta_j}) = 0.$$

Отсюда, поскольку с.п. $f(\lambda)$ строго положительна на E и, следовательно, конечная мера m абсолютно непрерывна относительно меры μ , вытекает, что

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m(e_{\beta_j}) = 0.$$

Зададим произвольное $\varepsilon > 0$ и выберем $\delta(E, \varepsilon)$ из следствия 2. Тогда для достаточно больших номеров j справедливы неравенства

$$m(E \setminus F_j) = m(e_{\beta_j}) < \delta(E, \varepsilon).$$

Поэтому, согласно следствию 2,

$$m_{\beta_j} \leq M_{\beta_j} \leq (1 + \varepsilon)^{\beta_j} \sqrt{\sigma_{\beta_j} m_{\beta_j}(E)};$$

$$m_{\beta_j} \leq (1 + \varepsilon)^{2\beta_j} \sigma_{\beta_j};$$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \beta_j \sqrt{\sigma_{\beta_j}} \geq \frac{\lim_{j \rightarrow \infty} \beta_j m_{\beta_j}}{(1 + \varepsilon)^2} \geq \frac{\tau(E)}{(1 + \varepsilon)^2}.$$

Сопоставляя последнее соотношение с соотношением (9) и учитывая произвольность ε и λ приходим к неравенству (6).

Перейдем к доказательству пункта в).

Пусть E состоит из объединения счетного числа дуг,

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \quad \text{и положим} \quad B_K = \bigcup_{n=1}^K E_n. \quad \text{Множества } B_K \text{ как}$$

отмечалось выше (см. лемму 4), — τ — измеримы, образуют возрастающую последовательность и $\bigcup_{K=1}^{\infty} B_K = E$. Следовательно, согласно лемме 3,

$$\tau_*(E) = \lim_{K \rightarrow \infty} \tau(B_K). \quad (10)$$

Далее, в силу определения минимизирующих многочленов P_n , имеем:

$$\sigma_n^2(E) = \int_E |P_n(z, E)|^2 d\mu \geq \int_{B_K} |P_n(z, E)|^2 d\mu \geq \int_{B_K} |P_n(z, B_K)|^2 d\mu = \sigma_n^2(B_K)$$

откуда вытекает, что для любого натурального K

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sigma_n(E)} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sigma_n(B_k)}.$$

Последний предел, согласно пункту б) теоремы I, равен $\tau(B_k)$, т.е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sigma_n(E)} \geq \tau(B_k). \quad (II)$$

Устремляя K в последнем неравенстве к бесконечности и учитывая (IO), получим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sigma_n(E)} \geq \tau_*(E). \quad (I2)$$

Сопоставляя соотношение (I2) с неравенством пункта а) теоремы и учитывая τ -измеримость E получим равенство (2).

Доказательство теоремы I завершено.

СЛЕДСТВИЕ 3. Для того, чтобы ошибка прогноза стремилась к нулю экспоненциально быстро, необходимо, чтобы с.п. $f(\lambda)$ обращалась в нуль на множестве положительной меры.

Действительно, если с.п. $f(\lambda)$ обращается в нуль лишь на множестве меры нуль, то можно считать, что $E = C$, а тогда из пункта б) теоремы I вытекает, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sigma_n(E)} = \tau(C) = 1.$$

что противоречит экспоненциальной сходимости.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2. Опять же в силу утверждения пункта а) теоремы I достаточно показать справедливость неравенства (6). Для этого, задав произвольное достаточно малое число $\varepsilon > 0$, рассмотрим на этот раз те подмножества $e_n \subset F$, для которых выполняются неравенства

$$|p_n(z)| < (\tau - \varepsilon)^n, \quad z \in e_n, \quad \tau = \tau(E).$$

Пусть z_n - точка, в которой достигается максимум M_n :

$$M_n = \max_{z \in F} |p_n(z)| = |p_n(z_n)|.$$

Согласно лемме 7

$$M_n = |p_n(z_n)| \leq (\tau - \varepsilon)^n e^n G_{e_n}(z_n, \infty).$$

Положим $E_n = E \cap e_n$. Тогда $E_n \subset e_n$, $G_{E_n}(z_n, \infty) \geq G_{e_n}(z_n, \infty)$

и, поэтому,

$$M_n \leq (\tau - \varepsilon)^n e^{n G_{E_n}(z_n, \infty)}.$$

Отсюда следует, что

$$G_{E_n}(z_n, \infty) \geq \ln \frac{\sqrt[n]{M_n}}{\tau - \varepsilon} \geq \ln \frac{\sqrt[n]{m_n(F)}}{(\tau - \varepsilon)}.$$

Так как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\sqrt[n]{m_n}}{\tau - \varepsilon} = \ln \frac{\tau}{\tau - \varepsilon} = \lambda > 0,$$

то для всех достаточно больших номеров $n \geq N(\lambda)$ выполняются неравенства:

$$G_{E_n}(z_n, \infty) \geq \frac{\lambda}{2}.$$

Согласно следствию I для этих номеров справедливы соотношения

$$m(E \setminus E_n) \geq \delta = \delta(\lambda) > 0. \quad (I3)$$

На множестве $E \setminus E_n$ имеет место неравенство

$$|p_n(z)| > (\tau - \varepsilon)^n.$$

Следовательно

$$\sigma_n^2 \geq \int_{E \setminus E_n} |p_n(z)|^2 d\mu > (\tau - \varepsilon)^{2n} \mu(E \setminus E_n).$$

Так как с.п. $f(\lambda)$ строго положительна на E , то в силу (I3) последовательность чисел $\mu(E \setminus E_n)$ не стремится к нулю и, значит,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sigma_n(E)} \geq \tau - \varepsilon. \quad (I4)$$

Учитывая произвольность ε , приходим к соотношению (6) и тем самым теорема 2 доказана.

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Соотношение (I) Розенблатта является частным случаем пункта б) теоремы I (когда множество $E = E\{f > 0\}$ состоит всего лишь из одной дуги длиной $2d$), причем отметим, что в теореме I непрерывности с.п. $f(\lambda)$ не требуется.

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Соотношение (2) нельзя распространить на произвольные замкнутые множества $E = E\{f > 0\}$. Действительно, покажем, что в противном случае соотношение (2) было бы справедливым и для всякого τ -измеримого E , а затем построим пример

\mathcal{T} -измеримого множества E , для которого (2) не выполняется.

Итак, пусть E - \mathcal{T} -измеримо и $F \subset E$ - замкнуто. Тогда легко показать, как это сделано при доказательстве пункта в) теоремы I, что

$$\bar{\sigma}_n(E) \geq \bar{\sigma}_n(F).$$

Отсюда, в силу предположения о справедливости соотношения (2) для множества F , имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\bar{\sigma}_n(E)} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\bar{\sigma}_n(F)} = \tau(F)$$

и, значит,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\bar{\sigma}_n(E)} \geq \sup_{F \subset E} \tau(F) = \tau_*(E).$$

Последнее неравенство вместе с утверждением а) теоремы I и \mathcal{T} -измеримостью E показывает что из справедливости (2) для всех замкнутых множеств E вытекает его справедливость и для всех \mathcal{T} -измеримых множеств E . Теперь построим \mathcal{T} -измеримое множество для которого соотношение (2) не выполняется.

Пусть F - единичная полуокружность, F_2 - дополнительная к F полуокружность, а множество $F_1 \subset F_2$ таково, что

$$\mu(F_1) = 0, \quad \tau(F_1) = \tau(F_2) \quad (15)$$

(оно существует согласно лемме I). Положим $E = F_1 \cup F$ и пусть с.п. $f(\lambda)$ положительна на E и равна нулю на $C \setminus E$.

В силу первого из соотношений (15) и теоремы I (пункт 6)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\bar{\sigma}_n(E)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\bar{\sigma}_n(F)} = \tau(F) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

В то же время, согласно свойству 5 емкости и второму из соотношений (15), имеем:

$$\tau(E) = \tau(F_1 \cup F) \geq \frac{\tau(F_1)}{\tau(F_2)} \tau(F_2 \cup F) = \tau(F_2 \cup F) = 1.$$

В заключение автор выражает благодарность И.А.Ибрагимову за постоянное внимание и помощь в работе.

Литература

1. Rosenblatt M. Some purely deterministic processes, -J. of rational mech. and analysis, 1957, v.6, N 6.
2. Геронимус Я.Л. О некоторых асимптотических свойст-

- вах полиномов.-Матем.сб., 1948, т.23 (65), № I, с.77-88.
3. К о р о в к и н П.П. Емкость множества и полиномы, минимизирующие интеграл. - Ученые зап.Калинингр.пединститута, 1958, вып.5.
 4. М а з и р к и е в и с з S. Un théorème sur les polynomes.- Ann. Soc. Pol..Math., 1945, t. 18, p. 113-117.
 5. И б р а г и м о в И.А. Об асимптотическом поведении ошибки прогноза.-Теория вероятн. и ее примен., 1964, т.9, № 4,с. 695-703.
 6. В а х т е r G., An asymptotic result for the finite predictor - Math.Scand., 1962, v.10, N 2, p. 137-144.
 7. G r e n a n d e r U., R o s e n b l a t t M. An extention of a theorem of G.Szegö and its application to the study of stochastic processes.-Trans.Amer.Math.Soc.1954,v.76,N 1,p.112-126.
 8. Г р е н а н д е р X., С е г е Г. Теллицевы формы и их приложения., М., 1961.
 9. Г о л у з и н Г.М. Геометрическая теория функций комплексного переменного, М., 1966.
 10. К о р о в к и н П.П. О росте функций.- ДАН СССР, 1951, т. 58, № 6, с. 1081-1084.
 11. Г о л и н с к и й Б.Л. Об асимптотическом поведении ошибки прогноза.-Теория вероятн. и ее примен., 1974, т.19, № 4, с. 724-739.