



Math-Net.Ru

All Russian mathematical portal

O. E. Samoilova, On graphs which can be drawn on an orientable surface with small number of intersections on an edge, *Zap. Nauchn. Sem. POMI*, 2014, Volume 427, 114–124

Use of the all-Russian mathematical portal Math-Net.Ru implies that you have read and agreed to these terms of use

<http://www.mathnet.ru/eng/agreement>

Download details:

IP: 18.97.9.173

January 18, 2025, 14:01:18



О. Е. Самойлова

**О ГРАФАХ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИЗОБРАЗИТЬ НА  
ОРИЕНТИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С МАЛЫМ  
ЧИСЛОМ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ НА РЕБРЕ**

§1. ВВЕДЕНИЕ

Мы будем рассматривать графы без петель и кратных ребер и их изображения на различных поверхностях. В работе будут использоваться стандартные обозначения. Множество вершин графа  $G$  будем обозначать  $V(G)$ , множество его ребер —  $E(G)$ , их количества —  $v(G)$  и  $e(G)$  соответственно. Минимальную степень графа  $G$  будем обозначать как  $\delta(G)$ , а его хроматическое число, то есть минимальное количество цветов в правильной раскраске вершин, как  $\chi(G)$ .

Широко известный классический факт гласит, что в планарном графе на  $v$  вершинах не более чем  $3v - 6$  ребер. Также несложно получить аналогичную оценку на количество ребер в графе, изображенном без пересечений ребер на поверхности рода  $g$ . В нашей работе будет рассматриваться похожая, но куда более интересная задача. А что если разрешить каждому ребру графа пересекать не более чем  $k$  других? Что тогда можно сказать об общем количестве ребер? Для произвольного графа  $G$ , изображенного с такими ограничениями на плоскости, при  $k \leq 4$  в работе [1] Янош Пах и Геза Тот доказали оценку  $e(G) \leq (k + 3)(v - 2)$ . Мы же будем рассматривать графы, изображенные на торе и других поверхностях, и получим оценку для них. Также будет получена верхняя оценка на хроматическое число таких графов.

**Определение 1.** Назовем граф  $g$ -сферическим, если его можно изобразить на ориентируемой поверхности рода  $g$  так, чтобы его ребра не пересекались во внутренних точках. 1-сферические графы также будем называть торическими.

0-сферические графы широко известны как планарные. Как и всегда при изображении графов считаем, что вершины изображаются

---

*Ключевые слова:* хроматическое число, плоские графы, графы на поверхностях.

точками, ребра – гладкими кривыми без самопересечений, не проходящими через вершины, отличные от концов ребра. Никакая точка пересечения ребер не принадлежит более чем двум рёбрам.

Пусть  $G$  –  $g$ -сферический граф. Его изображение без пересечений ребер на поверхности рода  $g$  делит ее на части, которые мы будем называть *гранями*. Количество граней будем обозначать  $f(G)$ . Рассмотрим ребро  $e$  графа  $G$ . Если по разные стороны от  $e$  находятся разные грани, то мы будем называть его *граничным* ребром этих двух граней. Если же по разные стороны от ребра  $e$  находится одна и та же грань, назовем его *внутренним* ребром этой грани. *Граничными вершинами* грани  $D$  будем называть концы внутренних и граничных ребер этой грани. *Граница* грани  $D$  – граф  $B(D)$ , вершины которого – граничные вершины грани  $D$ , а ребра – все граничные и внутренние ребра грани  $D$ . Размер границы грани  $D$  определим как сумму количества граничных ребер и удвоенного количества внутренних и обозначим  $b(D)$ .

Триангуляцией  $T(G)$  графа  $G$  назовем граф, который получен из  $G$  добавлением некоторых ребер так, что все его грани – треугольники, то есть гомеоморфны диску и их граница содержит по 3 вершины и 3 ребра. Кратные ребра при этом допускаются, но они не могут лежать в одной грани. Граф  $T(D)$  – триангуляция грани  $D$ , если он может быть получен сужением какой-либо триангуляции графа на множество вершин  $B(D)$ . Известно, что любую грань можно триангулировать и количество полученных треугольников не зависит от триангуляции. Будем обозначать это количество  $t(D)$  и называть размером триангуляции. Для графов, изображенных на плоскости или на сфере известна следующая лемма о связи размера границы грани и размера триангуляции.

**Лемма 1.** Пусть  $D$  – грань плоского графа. Если ее граница  $B(D)$  связна, то  $t(D) = b(D) - 2$ , иначе  $t(D) \geq b(D)$ .

Также в работе мы будем часто пользоваться теоремой Эйлера.

**Теорема.** Пусть на поверхности с эйлеровой характеристикой  $\chi$  изображен связный граф  $G$  так, что его ребра не пересекаются во внутренних точках, а каждая из его граней гомеоморфна диску. Тогда

$$v(G) - e(G) + f(G) = \chi.$$

Теорема также будет верна, если допустить в графе топологически различные грани, но вместо их количества учитывать сумму их эйлеровых характеристик.

Наконец, пришло время определить основной класс графов, который будет рассматриваться в работе.

**Определение 2.** Пусть  $k$  – целое неотрицательное число. Назовем граф  $k$ -почти  $g$ -сферическим, если его можно изобразить на ориентированной поверхности рода  $g$  так, чтобы каждое ребро пересекало во внутренних точках не более  $k$  других ребер.  $k$ -почти 1-сферический граф будем называть  $k$ -почти торическим.  $k$ -почти 0-сферические графы известны как  $k$ -почти планарные.

Для  $k$ -почти  $g$ -сферических графов будет доказана оценка сверху на количество ребер, аналогичная оценке Паха и Тота для  $k$ -почти планарных графов.

**Теорема 1.** При  $k \leq 4$  в  $k$ -почти  $g$ -сферическом графе на  $v$  вершинах не более чем  $(k + 3)(v + 2g - 2)$  ребер.

При  $k = 1$  и  $k = 2$  полученные оценки точны, серии примеров будут построены в работе.

Задачи о том, как связаны возможность изобразить граф без пересечений ребер и наименьшее количество цветов, в которое можно правильным образом покрасить его вершины, являются одними из самых старых в теории графов. Самая известная такая задача – теорема о четырех красках. Самый сильный из результатов в общей постановке задачи описан в [2]: П. Дж. Хивуд доказал, что при  $g \geq 1$  хроматическое число  $g$ -сферического графа не превосходит  $\frac{7 + \sqrt{1 + 48g}}{2}$ . В работе [4] была получена верхняя оценка хроматического числа для 1-почти  $g$ -сферических графов. Мы же шагнем дальше и получим верхнюю оценку для  $k$ -почти  $g$ -сферических графов.

**Теорема 2.** Пусть  $k, g$  – натуральные числа,  $k \leq 4$ . Тогда для любого  $k$ -почти  $g$ -сферического графа  $G$  выполняется

$$\chi(G) \leq \frac{2k + 7 + \sqrt{4k^2 + 12k + 1 + 16(k + 3)g}}{2}.$$

**Замечание.** Из теоремы 2 следует, что:

– вершины 1-почти  $g$ -сферического графа можно правильным образом покрасить в  $\lfloor \frac{9 + \sqrt{17 + 64g}}{2} \rfloor$  цветов;

- вершины 2-почти  $g$ -сферического графа – в  $\lfloor \frac{11+\sqrt{41+80g}}{2} \rfloor$  цветов;
- вершины 3-почти  $g$ -сферического графа – в  $\lfloor \frac{13+\sqrt{73+96g}}{2} \rfloor$  цветов;
- вершины 4-почти  $g$ -сферического графа – в  $\lfloor \frac{15+\sqrt{113+112g}}{2} \rfloor$  цветов.

## §2. ОЦЕНКА ЧИСЛА РЕБЕР ДЛЯ $k$ -ПОЧТИ $g$ -СФЕРИЧЕСКИХ ГРАФОВ ПРИ МАЛЫХ $k$

Сформулируем и докажем несколько технических лемм, которые понадобятся нам в дальнейшем.

**Лемма 2.** Пусть на поверхности с эйлеровой характеристикой  $\chi$  изображен граф  $G$  так, что никакие два его ребра не пересекаются во внутренних точках, а все его грани – треугольники. Тогда  $e = 3v - 3\chi$ ,  $f = 2v - 2\chi$ .

**Доказательство.** Каждая грань содержит три различных ребра, каждое ребро лежит ровно в двух гранях. Следовательно,  $3f = 2e$ . Подставляя это в теорему Эйлера, получаем:

$$\begin{aligned} v + \frac{2}{3}e - e &= \chi \\ \frac{1}{3}e &= v - \chi \\ e &= 3v - 3\chi \end{aligned}$$

А в силу того, что  $f = \frac{2e}{3}$ , получаем  $f = 2v - 2\chi$ .  $\square$

**Лемма 3.** Пусть  $D$  – грань графа, изображенного без пересечений ребер, гомеоморфная сфере с  $g$  ручками с  $k$  вырезанными дисками. Тогда  $t(D) = b(D) + 2(k + 2g - 2)$ .

**Доказательство.** Зафиксируем триангуляцию грани  $D$ . Теперь раздвоим все внутренние ребра границы  $D$  так, чтобы каждая компонента связности  $B(D)$  превратилась в простой цикл. Ясно, что сумма длин полученных циклов равна  $b(D)$ . Рассмотрим граф, вершинами которого являются вершины этих циклов, а ребрами – ребра циклов и ребра триангуляции грани. В полученном графе  $t(D) + k$  граней, из которых  $t(D)$  имеют по 3 ребра в границе, а остальные суммарно  $b(D)$  ребер. Значит,  $2e = 3t(D) + b(D)$ . Все грани этого графа – диски, их объединение – сфера с  $g$  ручками. Эйлерова характеристика сферы с

$g$  ручками равна  $2 - 2g$ . Применяя теорему Эйлера, получаем:

$$b(D) + t(D) + k - \frac{3t(D) + b(D)}{2} = 2 - 2g;$$

$$2b(D) + 2t(D) + 2k - 3t(D) - b(D) = 4 - 4g;$$

$$t(D) = b(D) + 2(k + 2g - 2). \quad \square$$

Теперь можем приступить к доказательству основной теоремы.

**Доказательство теоремы 1.** Будем рассматривать  $k$ -почти  $g$ -сферический граф  $G$  как его изображение на сфере с  $g$  ручками с минимальным количеством пересечений ребер. Зафиксируем максимальный по количеству ребер остовный  $g$ -сферический подграф  $M$  графа  $G$ . Все ребра из множества  $F = E(G) \setminus E(M)$  пересекают ребра графа  $M$ . Пусть  $f \in F$ . Назовем *полуребром* часть ребра  $f$  от вершины до первого пересечения с ребром графа  $M$ . Тогда у любого ребра из  $F$  ровно два различных полуребра. *Полуребрами грани  $D$*  назовем полуребра, выходящие вовнутрь грани  $D$  из ее вершин. Их количество будем обозначать  $h(D)$ . Теперь докажем о получившейся конструкции следующую лемму.

**Лемма 4.** Пусть  $D$  – грань графа  $M$  и  $t(D) \geq 1$ . Тогда

$$h(D) \leq (k + 1) \cdot t(D) - 1.$$

**Доказательство.** *Случай 1.* Грань  $D$  гомеоморфна диску.

В этом случае воспользуемся леммой, доказанной Пахом и Тотом в работе [1].

**Лемма 5.** Пусть  $k \leq 4$ , а  $D$  – грань графа  $M$ , гомеоморфная диску, с границей  $B(D)$  и  $b(D) \geq 3$ . Тогда

$$h(D) \leq (k + 1)(b(D) - 2) - 1.$$

По лемме 1 выполняется  $t(D) = b(D) - 2$ . Подстановка равенства в оценку Паха и Тота доказывает лемму в этом случае:

$$h(D) \leq (k + 1)(b(D) - 2) - 1 = (k + 1) \cdot t(D) - 1.$$

*Случай 2.* Грань  $D$  не гомеоморфна диску. Докажем, что в таком случае  $b(D) \leq t(D)$ . Рассмотрим компоненты связности границы  $B(D)$ . Раздвоив внутренние ребра, можем считать, что каждая из них – цикл. “Вклеим” внутрь каждого такого цикла диск. Получится ориентируемое двумерное многообразие. По теореме о классификации

ориентируемых двумерных многообразий в пространстве, полученная поверхность может быть лишь сферой с несколькими ручками (возможно, с нулем ручек). Значит, наша грань  $D$  гомеоморфна сфере с некоторым количеством ручек, из которой вырезано несколько дисков. При этом, случай, когда грань  $D$  – диск, уже рассмотрен отдельно. А в остальных случаях оценка  $b(D) \leq t(D)$  напрямую следует из леммы 3, так как сумма удвоенного количества ручек и количества вырезанных дисков хотя бы 2.

В силу определения  $k$ -почти  $g$ -сферического графа, каждое ребро границы содержит не более чем  $k$  концов полуребер грани  $D$ . Получаем

$$h(D) \leq k \cdot b(D) \leq k \cdot t(D) \leq (k + 1) \cdot t(D) - 1. \quad \square$$

Вернемся к доказательству теоремы. Пусть  $D_1, D_2, \dots, D_n$  – все грани графа  $M$ . Триангулируем граф  $M$ , тогда в полученной триангуляции  $T$  всего  $3v - 6 + 6g$  ребер и  $2v - 4 + 4g$  граней (см. лемму 2). Значит,  $\sum_{i=1}^n t(D_i) = 2v - 4 + 4g$ . При этом, в каждой грани проведено не менее чем  $t(D_i) - 1$  новых ребер. Получаем

$$e(M) \leq 3v - 6 + 6g - \sum_{i=1}^n (t(D_i) - 1) = 3v - 6 + 6g - (2v - 4 + 4g - n) = v + 2g - 2 + n.$$

Каждое ребро из  $e(G) \setminus e(M)$  содержит ровно два полуребра, поэтому

$$\begin{aligned} e(G) &= e(M) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n h(D_i) \\ &\leq v + 2g - 2 + n + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n ((k + 1)t(D_i) - 1) \\ &\leq v + 2g - 2 + n + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n ((k + 2)t(D_i) - 2) \\ &= v + 2g - 2 + n + (k + 2)(v + 2g - 2) - n = (k + 3)(v + 2g - 2). \quad \square \end{aligned}$$

Отметим, что при  $k = 1$  и  $k = 2$  оценка на количество ребер точная: можно привести бесконечные серии примеров, в которых достигается равенство.

Для начала построим серии примеров для  $k$ -почти торических графов. При  $k = 1$  изобразим на торе прямоугольную сетку  $m \times n$  (см.




Рис. 1. Прямоугольная сетка на торе.

рисунок 1), чтобы избежать кратных ребер возьмем  $m, n \geq 3$ . Получился торический граф, в котором  $mn$  вершин, все грани которого четырехугольники и их количество тоже  $mn$ . Ребер в этом графе  $2mn$ . Теперь внутри каждой грани проведем обе диагонали. Таким образом, добавилось по 2 ребра на каждой грани и граф стал 1-почти торическим. В получившемся графе  $mn$  вершин и  $4mn$  ребер, то есть  $e = 4v = (k + 3)v$ .

При  $k = 2$  начнем с построения торического графа, все грани которого – пятиугольники. На рис. 2 изображен такой граф на развертке тора. Вершины, попавшие на линию разреза, изображены повторно и отмечены одинаковыми номерами.

В приведенном примере всего 18 вершин. Можно добавлять в эту конструкцию по 6 вершин, пририсовывая еще один такой же столбец, что соответствует вклеиванию в тор цилиндра с соответствующим образом проведенными ребрами. Таким образом, получаем торические графы с  $v = 6n$  вершинами, в которых все грани пятиугольники. Тогда в них выполняется соотношение  $2e = 5f$  и из теоремы Эйлера следует, что в них  $4n$  граней и  $10n$  ребер. Теперь добавим в граф все диагонали всех граней. У каждой грани 5 диагоналей, значит, у получившегося графа  $30n$  ребер. Таким образом, выполняется  $e = 5v = (k + 3)v$ .

Аналогичный способ построения экстремальных примеров для 1- и 2-почти планарных графов описан в работе [1].



Теперь покажем, как имея экстремальный пример графа на поверхности рода  $g$ , построить пример на поверхности рода  $g + 1$ . Будем, опять же, рассматривать  $g$ -сферические графы, все грани которых четырех- и пятиугольники соответственно. Изобразим такой граф на поверхности рода  $g$ , выберем 2 любых несмежных грани  $D_1$  и  $D_2$ , вырежем из них окружности и вклеим цилиндр с основаниями в этих окружностях.

При  $k = 1$  на образовавшейся ручке построим нестягиваемый цикл из 4 вершин и соединим парами его вершины без пересечений с граничными вершинами  $D_1$  и с граничными вершинами  $D_2$ . Все получившиеся новые грани тоже являются четырехугольниками. Теперь, как и ранее, проведем по 2 диагонали на каждой грани. Докажем, что для всех полученных таким образом графов  $G$  выполняется соотношение  $e(G) = 4(v(G) - \chi)$ , где  $\chi$  – эйлерова характеристика рассматриваемой поверхности. Действительно, для  $g$ -сферического графа  $H$ , у которого все грани – четырехугольники, выполняется соотношение  $2e(H) = 4f(H)$ . Из теоремы Эйлера получаем  $v(H) - 2f(H) + f(H) = \chi$ , то есть  $v(H) = f(H) + \chi$ . После добавления диагоналей граней в граф добавляется  $2f(H)$  ребер, а количество вершин не изменяется, всего ребер становится  $e(G) = e(H) + 2f(H) = 4f(H) = 4(v(G) - \chi)$ , что и требовалось доказать.




Рис. 2. Торический граф из пятиугольников.

При  $k = 2$  на образовавшейся ручке построим нестягиваемый цикл из 10 вершин и соединим без пересечений четные его вершины с граничными вершинами грани  $D_1$ , а нечетные – с вершинами грани  $D_2$ . Назовем получившийся граф  $H$ . Граница любой вновь образовавшейся грани – цикл из пяти вершин: 3 подряд идущие вершины нового цикла и 2 смежные вершины грани  $D_1$  или  $D_2$ . Проведем в  $H$  все диагонали граней и докажем, что в получившемся 2-почти  $g$ -сферическом графе  $G$  выполняется  $e(G) = 5(v(G) - \chi)$ . Аналогично случаю  $k = 1$  получаем, что верны следующие соотношения:

$$2e(H) = 5f(H);$$

$$v(H) = \frac{3f(H)}{2} + \chi;$$

$$e(G) = 5f(H) + \frac{5f(H)}{2} = \frac{15f(H)}{2} = 5(v(G) - \chi),$$

что доказывает экстремальность построенных примеров.

### §3. Верхняя оценка на хроматическое число для $k$ -почти $g$ -сферических графов

**Доказательство теоремы 2.** Докажем, что в любом  $k$ -почти  $g$ -сферическом графе найдется вершина степени не более чем

$$\delta_{max} = \frac{2k + 7 + \sqrt{4k^2 + 12k + 1 + 16(k + 3)g}}{2} - 1.$$

Любая вершина в графе  $G$  имеет степень не больше, чем  $v(G) - 1$ . Кроме того, по теореме 1 выполняется

$$e(G) \leq (k + 3)(v(G) - 2 + 2g).$$

Поэтому обязательно найдется вершина степени не более чем

$$\frac{2(k + 3)(v(G) - 2 + 2g)}{v(G)},$$

иначе суммарная степень вершин будет больше удвоенного количества ребер. Значит,

$$\delta(G) \leq \min \left( v(G) - 1, \frac{2(k + 3)(v(G) - 2 + 2g)}{v(G)} \right).$$

Первая из этих двух функций от  $v(G)$  строго возрастает, а вторая – нестрого убывает при  $g \geq 1$ . Поэтому максимум этого выражения достигается при таком  $v_0$ , что значения этих функций равны, то есть

$$v_0 - 1 = \frac{2(k+3)(v_0 - 2 + 2g)}{v_0}.$$

Решая квадратное уравнение, получаем

$$v_0 = \frac{2k + 7 + \sqrt{4k^2 + 12k + 1 + 16(k+3)g}}{2},$$

а максимум выражения равен  $v_0 - 1 = \delta_{max}$ .

Теперь докажем индукцией по количеству вершин, что вершины любого  $k$ -почти  $g$ -сферического графа можно правильным образом покрасить в  $\lfloor \delta_{max} \rfloor + 1$  цвет. Очевидно, одну вершину можно покрасить. Покрасим граф на  $v$  вершинах, при условии, что все меньшие графы уже покрашены. Найдем вершину степени не больше, чем  $\lfloor \delta_{max} \rfloor$  и выкинем её. Получившийся граф тоже  $k$ -почти  $g$ -сферический, поэтому его вершины можно правильно покрасить в  $\lfloor \delta_{max} \rfloor + 1$  цвет. Теперь добавим выкинутую вершину. Так как с ней смежно не более чем  $\lfloor \delta_{max} \rfloor$  вершин, обязательно найдется цвет, не занятый соседями, в который мы ее и покрасим.  $\square$

#### ЛИТЕРАТУРА

1. J. Pach, G. Toth., *Graphs drawn with few crossing per edge*. — *Combinatorica* **17**, No. 3 (1997), 427–439.
2. P. J. Heawood, *Map colour theorem*. — *Quart. J. Math.* **24** (1890), 332–338.
3. Д. В. Карпов, *Верхняя оценка количества ребер в двудольном почти планарном графе*. — *Зап. научн. семин. ПОМИ* **406** (2012), 12–30.
4. Г. В. Ненашев, *Оценка хроматического числа почти планарного графа*. — *Зап. научн. семин. ПОМИ* **406** (2012), 95–106.

Samoilova O. E. On graphs which can be drawn on an orientable surface with small number of intersections on an edge.

Let  $k$  and  $g$  be nonnegative integers. We call a graph  $k$ -nearly  $g$ -spherical, if it can be drawn on an orientable surface of genus  $g$  such that each edge intersects at most  $k$  other edges in inner points. It is proved that for  $k \leq 4$  the number of edges of a  $k$ -nearly  $g$ -spherical graph on  $v$  vertices does not

exceed  $(k + 3)(v + 2g - 2)$ . It is also proved that the chromatic number of a  $k$ -nearly  $g$ -spherical graph does not exceed  $\frac{2k+7+\sqrt{4k^2+12k+1+16(k+3)g}}{2}$ .

С.-Петербургский  
государственный университет  
Университетский пр. 28, Петродворец,  
198504 Санкт-Петербург, Россия  
*E-mail*: geraolga91@gmail.com

Поступило 5 ноября 2014 г.