



Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

В. Г. Чирский, Оценки линейных форм и многочленов от совокупностей полидических чисел,  
*Чебышевский сб.*, 2011, том 12, выпуск 4, 129–133

<https://www.mathnet.ru/cheb116>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением

<https://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 18.97.14.91

28 апреля 2025 г., 02:51:38



ЧЕБЫШЕВСКИЙ СБОРНИК  
Том 12 Выпуск 4 (2011)

---

УДК 511.36

ОЦЕНКИ ЛИНЕЙНЫХ ФОРМ И МНОГОЧЛЕНОВ ОТ  
СОВОКУПНОСТЕЙ ПОЛИАДИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ

В. Г. Чирский (г. Москва)

**Аннотация**

В работе получены оценки снизу полиадического расстояния от  $O$  для линейных форм и многочленов с целыми коэффициентами от некоторых совокупностей полиадических чисел.

**ESTIMATES OF LINEAR FORMS AND POLYNOMIALS  
IN POLYADIC NUMBERS**

V. G. Chirskii(Moscow)

**Abstract**

The paper presents estimates from below of the polyadic distance from zero for linear forms and polynomials with integer coefficients in certain polyadic numbers.

На кольце  $\mathbb{Z}$  целых чисел можно ввести топологию  $\tau$ , рассматривая множество идеалов  $(m)$  в качестве полной системы окрестностей нуля аддитивной группы целых чисел. При этом операции сложения и умножения непрерывны и кольцо целых чисел с введенной топологией имеет структуру топологического кольца (см. [1], [2]). Обозначив это кольцо  $\mathbb{Z}_\tau$ . На кольце  $\mathbb{Z}_\tau$  можно ввести метрику (см. [1], [3]), положив

$$\rho(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\delta_m(x, y)}{2^m}, \quad (1)$$

где

$$\delta_m(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \equiv y \pmod{m}, \\ 1, & \text{если } x \not\equiv y \pmod{m}. \end{cases} \quad (2)$$

Бесконечная последовательность  $x_1, x_2, \dots$  целых чисел называется фундаментальной, если для любого  $k \in \mathbb{N}$  существует  $N \in \mathbb{N}$  такое, что для всех  $m, n > N$  справедливо сравнение  $x_m \equiv x_n \pmod{k!}$ .

Метрическое пространство  $\mathbb{Z}_\tau$  не является полным. Например, последовательность  $1!, 1! + 2!, \dots, 1! + 2! + \dots + n!, \dots$  является фундаментальной, но не

имеет предела в  $\mathbb{Z}_\tau$ . Для фундаментальных последовательностей  $\{x_k\}$  и  $\{y_k\}$  рассмотрим последовательности  $\{x_k + y_k\}$ ,  $\{x_k - y_k\}$ ,  $\{x_k \cdot y_k\}$ . Эти последовательности также являются фундаментальными. Таким образом, фундаментальные последовательности элементов из кольца  $\mathbb{Z}_\tau$  образуют кольцо.

Будем называть последовательность  $c_1, c_2, \dots$  нулевой последовательностью, если  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$ , где предел понимается в смысле топологии кольца  $\mathbb{Z}_\tau$ .

Назовем фундаментальные последовательности  $\{x_k\}$  и  $\{y_k\}$  эквивалентными, если их разность  $\{x_k - y_k\}$  является нулевой последовательностью. Это свойство является рефлексивным, симметричным и транзитивным, т.е. определяет отношение эквивалентности.

Полиадическим числом будем называть класс эквивалентных фундаментальных последовательностей из  $\mathbb{Z}_\tau$ .

Легко проверить, что если последовательность  $\{x_k\}$  эквивалентна последовательности  $\{u_k\}$ , а последовательность  $\{y_k\}$  эквивалентна  $\{v_k\}$ , то  $\{x_k + y_k\}$  эквивалентна  $\{u_k + v_k\}$ ,  $\{x_k - y_k\}$  эквивалентна  $\{u_k - v_k\}$ ,  $\{x_k \cdot y_k\}$  эквивалентна  $\{u_k \cdot v_k\}$ . Поэтому на множестве полиадических чисел можно ввести операции сложения и умножения, что позволяет говорить о кольце  $\mathfrak{G}$  целых полиадических чисел. Вложение кольца  $\mathbb{Z}$  в  $\mathfrak{G}$  осуществляется сопоставлением элементу  $x \in \mathbb{Z}$  класса  $\mathfrak{x}$  фундаментальных последовательностей, эквивалентных последовательности  $x, x, x, \dots$

Так как  $\mathbb{Z}_\tau$  - метрическое пространство, его пополнение приводит к топологическому пространству  $\mathfrak{G}_\tau$ . Кольцо  $\mathfrak{G}_\tau$  можно метризовать. Пусть  $\mathfrak{x} \in \mathfrak{G}_\tau$  состоит из последовательностей  $\{x_k\}$ , а  $\mathfrak{y} \in \mathfrak{G}_\tau$  - последовательностей  $\{y_k\}$ .

Определим

$$\rho(\mathfrak{x}, \mathfrak{y}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, y_k), \quad (3)$$

где расстояние  $\rho(x_k, y_k)$  между элементами  $x_k, y_k \in \mathbb{Z}_\tau$  определено равенством (1).

Элементы  $\mathfrak{a} \in \mathfrak{G}_\tau$  имеют каноническое представление в виде ряда

$$\mathfrak{a} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n! \quad (4)$$

где  $a_n \in \{0, 1, \dots, n\}$ .

Кольцо  $\mathfrak{G}_\tau$  является прямым произведением колец  $\mathbb{Z}_{p_i}$  по всем простым числам  $p_i$ , при этом ряд  $\mathfrak{a}$  сходится в любом  $\mathbb{Z}_{p_i}$ . Действительно, степень, в которой простое число  $p$  входит в разложение числа  $n!$  на простые множители, равна  $\frac{n-S_n}{p-1}$ , где  $S_n$  - сумма цифр в  $p$ -ичном разложении числа  $n$ . Следовательно, для любого  $p_i$  при  $n \rightarrow \infty$

$$|a_n \cdot n!|_{p_i} \rightarrow 0,$$

что является достаточным условием сходимости ряда (4) в  $\mathbb{Z}_{p_i}$ .

Одной из задач теории трансцендентных чисел является задача получения оценки снизу для линейных форм и многочленов от совокупностей чисел.

Рассмотрим совокупность  $\bar{a}$  полиадических чисел  $a_1, \dots, a_m$ . Обозначим

$$L(\bar{a}) = h_1 a_1 + \dots + h_m a_m, \quad (5)$$

где  $h_1, \dots, h_m \in \mathbb{Z}$ ,  $H = \max_{i=1, \dots, m} |h_i|$ .

Число  $H$  называют высотой линейной формы (5).

**ТЕОРЕМА 1.** Пусть существует число  $H_0$  такое, что для любой линейной формы (5), коэффициенты которой удовлетворяют условию  $H \geq H_0$ , существует интервал  $(a(H), b(H))$ , где  $a(H) < b(H)$ ,  $a(H), b(H)$  - возрастающие функции и существует простое число  $p$ ,  $p \in (a(H), b(H))$  такое, что

$$|L(\bar{a})|_p > p^{-r(p, H)}$$

при некотором  $r(p, H) \in \mathbb{N}$ . Тогда существуют последовательность чисел  $H_k$ ,  $H_k \in \mathbb{N}$ , последовательность простых чисел  $p_k$  и последовательность чисел  $r_k = r(p_k, H_k)$  такие, что определенное равенством (3) расстояние  $\rho(L(\bar{a}), 0)$  удовлетворяет неравенству

$$\rho(L(\bar{a}), 0) \geq \sum_{m \in M} \frac{1}{2^m}, \quad (6)$$

где  $M = \bigcup_{k=1}^{\infty} M_k$ , а множество  $M_k$  состоит из натуральных чисел, которые делятся хотя бы на одно из чисел  $p_i^{r_i}$ ,  $i = 1, \dots, k$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $H \geq H_0$ . Положим  $H_1 = H$ ,  $\gamma_1 = 1$ , а число  $p_1$  положим равным тому простому числу  $p$ , существование которого требуется в условии теоремы. Предполагая, что для числа  $k \geq 2$  уже выбраны все числа  $H_l$ ,  $\gamma_l$ ,  $p_l$ ,  $l \leq k-1$ , выберем число  $\gamma_k \in \mathbb{N}$  так, что для  $H_k = \gamma_k H$  выполняется условие

$$b(H_{k-1}) \leq b(H_k). \quad (7)$$

Этого можно добиться, так как функции  $a(x)$  и  $b(x)$  возрастают по условию.

Рассмотрим линейную форму  $L_k(\bar{a}) = \gamma_k L(\bar{a})$ . Ее высота равна  $H_k = \gamma_k H_k$  удовлетворяет неравенству  $H_k \geq H_0$ .

По условию теоремы, в интервале  $(a(H_k), b(H_k))$  существует простое число  $p_k$  такое, что

$$|L_k(\bar{a})|_{p_k} > p_k^{-r_k}, \quad (8)$$

причем, ввиду (7), число  $p_k$  отлично от  $p_1, \dots, p_{k-1}$ . Так как  $L_k(\bar{a}) = \gamma_k L(\bar{a})$  и  $\gamma_k \in \mathbb{N}$ , из (8) следует неравенство

$$|L(\bar{a})|_{p_k} > p_k^{-r_k},$$

откуда в виду сделанных предположений, получим

$$|L(\bar{a})|_{p_l} > p_l^{-r_l}, l = 1, \dots, k. \quad (9)$$

Рассмотрим теперь произведение

$$\prod_{l=1}^k p_l^{-r_l} \quad (10)$$

и выберем число  $N_k \in \mathbb{N}$  так, чтобы число  $N_k!$  делилось на число (10).

Предположим, что  $\mathfrak{a}_i \in \mathfrak{G}_\tau$  имеет вид

$$\mathfrak{a}_i = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n,i} n!, \quad a_{n,i} \in \{0, 1, \dots, n\}, \quad i = 1, \dots, n$$

и обозначим

$$\mathfrak{a}_{i,N_k} = \sum_{n=1}^{N_k} a_{n,i} n!. \quad (11)$$

Ввиду свойств  $p$ -адического нормирования и неравенств (9), для всех  $l = 1, \dots, k$  выполняется неравенство

$$|L(\bar{\mathfrak{a}}_{N_k})|_{p_l} > p_l^{-r_l}. \quad (12)$$

Кроме того из (11), (5) следует что  $L(\bar{\mathfrak{a}}_{N_k}) \in \mathbb{Z}$ .

Оценим определенное равенством (1) расстояние  $\rho(L(\bar{\mathfrak{a}}_{N_k}), 0)$ . Из неравенств (12) следует, что  $L(\bar{\mathfrak{a}}_{N_k})$  не делится ни на одно из чисел  $p_i^{r_i}$ ,  $i = 1, \dots, k$ .

Поэтому из (2) следует, что если  $m \in \mathbb{N}$  делится хотя бы на одно из чисел  $p_i^{r_i}$ ,  $i = 1, \dots, k$ , то

$$\delta_m(L(\bar{\mathfrak{a}}_{N_k}), 0) = 1.$$

Значит,

$$\rho(L(\bar{\mathfrak{a}}_{N_k}), 0) \geq \sum_{m \in M_k} \frac{1}{2^m}, \quad (13)$$

где, как определено в формулировке теоремы, множество  $M_k$  состоит из чисел  $m$ , которые делятся хотя бы на одно из чисел  $p_i^{r_i}$ ,  $i = 1, \dots, k$ .

Так как  $M_{k+1} \supset M_k$  для любого  $k$  и так как при  $k \rightarrow \infty$

$$L(\bar{\mathfrak{a}}_{N_k}) \rightarrow L(\bar{\mathfrak{a}})$$

в кольце  $\mathfrak{G}_\tau$  по определению (3) получим, что неравенство (6) и следовательно, теорема доказаны.

**ЗАМЕЧАНИЕ 1.** Правую часть неравенства (13) можно представить, как разность двух чисел, причем уменьшаемое число представляет собой сумму всех геометрических прогрессий, знаменатели которых представляют собой число 2, возведенное в степень, равную произведению нечетного числа различных множителей вида  $p_i^{r_i}$ ,  $i = 1, \dots, k$ . Вычитаемое число имеет аналогичную структуру, но степень числа 2 равна произведению четного числа таких множителей.

**ТЕОРЕМА 2.** Пусть существует  $H_0$  такое, что для любого отличного от тождественного нуля многочлена  $P(\bar{x}) = P(x_1, \dots, x_m)$  степени  $d$  по совокупности переменных и высоты  $H$ , удовлетворяющей условию  $H \geq H_0$ , существует интервал  $(a(H), b(H))$ ,  $a(H) < b(H)$ ,  $a(H), b(H)$  - возрастающие функции и существует простое число  $p$ ,  $p \in (a(H), b(H))$  такое, что

$$|P(\bar{a})|_p > p^{-r(p,d,H)}$$

при некотором  $r(p,d,H) \in \mathbb{N}$ . Тогда существует последовательность чисел  $H_k$ ,  $H_k \in \mathbb{N}$ , последовательность простых чисел  $p_k$  и последовательность чисел  $r_k = r(p_k, d, H_k)$  такие, что расстояние  $\rho(P(\bar{a}), 0)$  удовлетворяет неравенству

$$\rho(P(\bar{a}), 0) \geq \sum_{m \in M} \frac{1}{2^m}, \quad (14)$$

где  $M = \bigcup_{k=1}^{\infty} M_k$ , а множество  $M_k$  состоит из натуральных чисел, которые делятся хотя бы на одно из чисел  $p_i^{r_i}$ ,  $i = 1, \dots, k$ .

Доказательство теоремы 2 совпадает с доказательством теоремы 1, в котором все величины  $L(\bar{a})$ ,  $L(\bar{a}_{N_k})$  заменены, соответственно на  $P(\bar{a})$ ,  $P(\bar{a}_{N_k})$ , что и доказывает неравенство (14).

## СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Постников А. Г. Введение в аналитическую теорию чисел. М. Наука. 1971.
- [2] Понtryгин Л. С. Непрерывные группы. М. Наука. 1984 .
- [3] Новоселов Е. В. Топологическая теория делимости целых чисел. Учен. зап. Елабуж. гос. пед. ин-та 3, 1960, С. 3 – 23.

Московский педагогический государственный университет

Поступило 23.12.2011