

Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал


С. В. Кисляков, Продолжение операторов, заданных на рефлексивных подпространствах в L^1 или L^1/H_0^1 , Зап. научн. сем. ПОМИ, 2000, том 270, 103–123

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 18.97.14.88

22 января 2025 г., 15:24:28



С. В. Кисляков

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ,
ЗАДАННЫХ НА РЕФЛЕКСИВНЫХ
ПОДПРОСТРАНСТВАХ В L^1 ИЛИ L^1/H_0^1

§0. ВВЕДЕНИЕ

Типичным примером теорем о продолжении, составляющих предмет этой статьи, является следующий результат Ж. Бургейна (см. обзоры [1, 2]). Обозначим через \mathbb{T} единичную окружность с нормированной мерой Лебега m . Под “оператором” мы всегда будем понимать линейный ограниченный оператор.

Теорема А. *Пусть X – это либо $L^1(\mu)$, либо $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$, и пусть E – рефлексивное подпространство в X . Тогда всякий оператор $T : E \rightarrow H^\infty$ допускает продолжение до оператора, действующего из X в H^∞ .*

Эта теорема была доказана в связи с установленным несколько ранее (см. [3]) аналогом теоремы Гrotендика для пространства $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$ и переформулировкой утверждения теоремы Гrotендика в терминах продолжения операторов (см. теорему В ниже). Напомним вкратце, о чем идет речь. Теорема Гrotендика гласит, что всякий оператор из $L^1(\mu)$ в l^2 является 1-суммирующим (см., например, [4] по поводу определений и свойств p -суммирующих операторов). Любое пространство Y , на которой переносится это свойство пространства $L^1(\mu)$, называется GT -пространством. Напомним еще определение пространств котипа 2: это – ровно те, в которых для любых векторов x_1, \dots, x_n выполняется неравенство

$$\left(\sum \|x_i\|^2 \right)^{1/2} \leq c \int_0^1 \left\| \sum x_i r_i(t) \right\| dt,$$

где $\{r_i\}$ – функции Радемахера, а постоянная c не зависит ни

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 99-01-00103), ФЦП интеграция (рег. № 326.53) и Шведской Королевской Академии наук.

от векторов x_i , ни от их числа. Подпространство в $L^1[0, 1]$, наложенное на функции Радемахера, будем обозначать через R . В силу неравенства Хинчина это подпространство изоморфно пространству l^2 (в частности, рефлексивно). Следующий факт был установлен в [5] (см. также [6]).

Теорема В. *Для того, чтобы банахово пространство Y было GT -пространством котипа 2, необходимо и достаточно, чтобы всякий оператор $T : R \rightarrow Y^*$ допускал продолжение до оператора, действующего из $L^1[0, 1]$ в Y^* .*

Из приведенной формулировки видно, что теорема А содержит в качестве довольно частного случая утверждение о том, что $Y = L^1(\mathbb{T})/H_0^1$ – (GT) -пространство котипа 2. Действительно, $Y^* = H^\infty$, и достаточно применить теорему А к подпространству R в $L^1[0, 1]$.

В этой статье мы приследуем две цели. Во-первых, будет описан общий подход к доказательству теорем о продолжении указанного выше вида (см. §2). Вот как выглядит этот подход в ситуации теоремы В. На пространстве R эквивалентны нормы всех пространств $L^p[0, 1]$ с $1 \leq p < \infty$ (неравенство Хинчина). Более того, при $p > 1$ пространство R дополняемо в $L^p[0, 1]$, поэтому расширение на L^p ($p > 1$) любого оператора $T : R \rightarrow Y^*$ не встречает никаких препятствий. Как мы увидим, при некоторых условиях отсюда с помощью интерполяционных соображений можно вывести и продолжимость любого оператора $T : R \rightarrow Y^*$ на L^1 . В ситуации теоремы А дело обстоит похожим образом: продолжение оператора на $L^p(\mu)$ (или $L^p(\mathbb{T})/H_0^p$) с некоторым $p > 1$ тоже оказывается относительно легкой задачей, а затем вступают в игру такие же интерполяционные соображения.

Во-вторых (см. §§3, 4), мы займемся вопросом о том, до какой степени теорему В можно в тех или иных конкретных случаях обобщить в духе теоремы А. Именно, пусть Y – GT -пространство котипа 2. Для каких рефлексивных подпространств E в $L^1(\mu)$ (или в $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$) всякий оператор $T : E \rightarrow Y^*$ продолжается на $L^1(\mu)$ (соответственно, на $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$)? Когда это так для произвольного рефлексивного E ?

В классическом случае, когда $Y = L^1(\nu)$, ответ хорошо известен: операторы со значениями в $Y^* = L^\infty(\nu)$ и заданные где угодно продолжаются куда угодно. Исторически первым примером GT -пространств, отличных от $L^1(\nu)$, были факторпростран-

ства $L^1(\nu)/F$, где F рефлексивно и бесконечномерно (см. [7, 8] и монографию [6]). Эти факторпространства обладают и котипом 2. Как мы увидим, для них имеется практически исчерпывающий ответ на поставленные вопросы. Упомянутое продолжение возможно с любого рефлексивного подпространства E (неважно, в $L^1(\mu)$ или в $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$) тогда и только тогда, когда пространство F – гильбертово и для каждого $p \in (1, 2]$ после надлежащей замены плотности становится дополняемым подпространством в L^p (точная формулировка дана в §4). Аналогичные результаты верны и для факторпространств пространства $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$ по его рефлексивным подпространствам. Такие факторы действительно являются GT -пространствами котипа 2 в силу [6, Глава 6, д]. Впрочем, подход настоящей статьи позволяет проверить это независимым образом (см. следствие 1 к теореме 1, §3).

Во всех этих рассмотрениях общая теорема о продолжении из §2 будет играть весьма заметную роль.

§1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Константы $k_p(X)$. Напомним, что по теореме Пича оператор $T : X \rightarrow Y$ является p -суммирующим тогда и только тогда, когда он допускает факторизацию вида

$$T : X \xrightarrow{A} U \xrightarrow{I_{p,\mu}} V \xrightarrow{B} Y,$$

где μ – некоторая конечномерная мера, $I_{p,\mu} : L^\infty(\mu) \rightarrow L^p(\mu)$ – оператор тождественного вложения, а U, V – некоторые подпространства, соответственно, в $L^\infty(\mu)$ и $L^p(\mu)$ такие, что $I_{p,\mu}(U) \subset V$. Для наших целей это свойство можно принять за определение. Норма $\pi_p(T)$ оператора T в классе p -суммирующих операторов вычисляется по формуле $\pi_p(T) = \inf \|A\| \|\mu\|^{1/p} \|B\|$, где нижняя грань берется по всем факторизациям.

Далее, пусть $\varkappa_Y : Y \rightarrow Y^{**}$ – каноническое вложение. Оператор $T : X \rightarrow Y$ называется p -интегральным, если композиция $\varkappa_Y T$ допускает факторизацию вида

$$\varkappa_Y T : X \xrightarrow{A} L^\infty(\mu) \xrightarrow{I_{p,\mu}} L^p(\mu) \xrightarrow{B} Y^{**};$$

p -интегральная норма оператора T вычисляется по формуле $i_p(T) = \inf \|A\| \|\mu\|^{1/p} \|B\|$ (нижняя грань снова берется по всем факторизациям).

Наконец, для банахова пространства X определим величину $k_p(X)$: считаем ее бесконечной, если на X существует p -суммирующий, но не p -интегральный оператор (с какой угодно областью значений); в противном же случае положим $k_p(X) = \sup(i_p(T)/\pi_p(T))$, где верхняя грань берется по всевозможным ненулевым p -суммирующим операторам $T : X \rightarrow Y$ и всевозможным пространствам Y .

Константы $k_p(X)$ были введены в [9]. Напомним некоторые их свойства, ограничившись случаем, когда $1 < p < \infty$; см. [10] по поводу доказательств. Наиболее существенно следующее утверждение: $k_p(X) < \infty$ тогда и только тогда, когда для всякого подпространства E в $L^{p'}(\lambda)$ всякий оператор $T : E \rightarrow X$ допускает продолжение $\tilde{T} : L^{p'}(\lambda) \rightarrow X^{**}$ (более аккуратно было бы говорить о продолжении оператора $\pi_X T$; здесь и ниже p' – показатель, сопряженный с p). При этом $k_p(X) = \sup\{\inf\|\tilde{T}\| : \|T\| = 1\}$, где верхняя грань берется по всем E и T , а нижняя грань в фигурных скобках – по всем продолжениям \tilde{T} . Далее, если $2 \leq r \leq p$ или $p \leq r \leq 2$, то $k_r(X) \leq k_p(X)$. Наконец, $k_p(H^\infty) \asymp \max\{p, p'\}$; поскольку H^∞ – сопряженное пространство, отсюда следует, что всякий оператор, заданный на подпространстве в L^p ($1 < p < \infty$) и принимающий значений в H^∞ , продолжается на все L^p .

Подчеркнем, что, хотя полное доказательство упомянутых свойств пространства H^∞ не очень коротко, оно почти целиком проводится “мягкими” (“soft”) методами функционального анализа. Из классического анализа берется лишь одно несложное рассуждение, использующее непрерывность проектора Рисса в $L^p(\mathbb{T})$ при $1 < p < \infty$ и конструкцию внешней функции. См. [9] и [10].

1.2. Рефлексивные пространства в $L^1(\mu)$. Меру μ мы будем считать конечной и не чисто дискретной (и часто – вероятностной). Доказательства большинства приведенных ниже утверждений можно найти, например, в [10].

Пространство $E \subset L^1(\mu)$ рефлексивно тогда и только тогда, когда оно изоморфно подпространству в L^p с некоторым $p \in (1, 2]$. В больших подробностях дело обстоит так. Обозначим через $t(E)$ верхнюю грань таких чисел q , что для любых векторов $\{x_j\} \subset E$,

для которых $\sum \|x_j\|^q = 1$, величина

$$\int_0^1 \left\| \sum r_j(t) x_j \right\| dt$$

конечна (так называемый “показатель радемахерова типа пространства E ”). Всегда $1 \leq t(E) \leq 2$, если $E \subset L^1(\mu)$, то рефлексивность пространства E эквивалентна неравенству $t(E) > 1$.

Плотностью назовем любую положительную функцию a из $L^1(\mu)$. Отображение $f \mapsto f/a$ является изометрией пространства $L^1(\mu)$ на $L^1(a\mu)$. Оказывается, что если E рефлексивно, то для любого $p \in (1, t(E))$ можно найти плотность a такую, что нормы пространств $L^1(a\mu)$ и $L^p(a\mu)$ будут эквивалентны на образе пространства E под действием описанной изометрии. (Иными словами, вложение в L^p достигается заменой плотности). В таком случае будем называть меру $a\mu$ *p-допустимой* для E . Если $t(E) = 2$, то в приведенном утверждении можно взять $p = 2$ (таким образом, существуют 2-допустимые меры и E гильбертово). Обратно, $t(H) = 2$ для любого гильбертова пространства H .

Имеется язык, позволяющий не упоминать явно замену плотности в этих вопросах. Именно, реализуем $L^\infty(\mu)$ как пространство $C(K)$. Тогда $L^1(\mu)$ вкладывается естественным образом в пространство $C(K^*) = M(K)$, поэтому E можно рассматривать как некое пространство мер на K . Для $\nu \in M(K)$ мы будем писать $E \subset L^1(\nu)$ если все меры из E абсолютно непрерывны относительно ν . Такую меру ν считаем *p-допустимой* для E , если нормы пространств $L^1(\nu)$ и $L^p(\nu)$ эквивалентны на E .

Наконец, отметим следующий факт.

Лемма 1. *Пусть E – дополняемое подпространство в $L^r(\mu)$ ($1 < r \leq 2$), причем нормы пространств $L^r(\mu)$ и $L^1(\mu)$ эквивалентны на E . Тогда E изоморфно гильбертову пространству.*

Доказательство. При $r = 2$ доказывать нечего. Пусть $r < 2$. Очевидно, что сопряженное E^* изоморфно некоторому подпространству U в $L^{r'}(\mu)$. Согласно результатам статьи [12], если U не изоморфно гильбертову пространству, то в U имеется дополняемое подпространство, изоморфное $l^{r'}$. Следовательно, в E имеется дополняемое подпространство, изоморфное l^r . Однако на таком пространстве нормы $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_r$ не могут быть эквивалентны, см., например, [11]. \square

Замечание. Вместо [12] можно воспользоваться результатами статьи [13] – они дают лучшее представление о взаимозависимости некоторых количественных характеристик, скрывающихся за качественной формулировкой леммы.

1.3. Рефлексивные подпространства в $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$. Пусть $\pi : L^1(\mathbb{T}) \rightarrow L^1(\mathbb{T})/H_0^1$ – каноническое факторотображение.

Теорема (Бургейн, [3, следствие 2.13]). *Если E – рефлексивное подпространство в $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$, то существует такой оператор $i : E \rightarrow L^1(\mathbb{T})$, что $(\pi i)e = e$, $e \in E$.*

Обозначим $F = i(E)$, тогда F – рефлексивное подпространство в $L^1(\mathbb{T})$, причем π изоморфно отображает F на E . Напомним, что нормированная мера Лебега на \mathbb{T} обозначается через m . Плотность a называется p -допустимой для E ($p > 1$), если мера am p -допустима для F . Увеличив слегка функцию a (при увеличении плотности она остается p -допустимой), мы можем считать, что $\log a \in L^1(\mathbb{T})$. (Можно даже обеспечить включение $\log a \in BMO$, см., например, обзор [14]. Это понадобится в дальнейшем.) Пусть A – внешняя функция, для которой $|A| = a$: $A = \exp(\log a + i\mathcal{H}(\log a))$, где \mathcal{H} – оператор гармонического сопряжения. Отображение $f \mapsto f/A$ есть изометрия пространства L^1 на $L^1(am)$, переводящая H_0^1 на $H_0^1(am)$. Образ F_1 пространства F при этой изометрии лежит в $L^p(am)$. Обозначим через E_1 естественную проекцию пространства F_1 в факторпространство $L^p(am)/H_0^p(am)$. Тогда естественная инъекция $j : L^p(am)/H_0^p(am) \rightarrow L^1(am)/H_0^1(am)$, очевидно, будет изоморфно отображать E_1 на $A^{-1} \cdot E$.

Иными словами, мы пришли к картине, аналогичной той, что была в случае школы L^p .

Если $\log a \in BMO$, то из интерполяционных соображений (K -замкнутость в шкале $H_0^s(a)$, см., например, [14]) следует, что и при $\alpha < 1$ пространства $H_0^\alpha(a)$ и F_1 образуют прямое разложение их векторной суммы в $L^\alpha(a)$.

Отметим еще, что при $p > 1$ факторпространство $L^p(a)/H_0^p(a)$ изоморфно пространству $L^p(\mathbb{T})$.

1.4. Пространства векторнозначных функций. Мы свободно пользуемся понятием проективного (гротендицковского) тензорного произведения $A \hat{\otimes} B$ двух банаевых пространств. Напомним каноническое отождествление $L^1(\mu) \hat{\otimes} B = L^1(B, \mu)$.

Пусть E – подпространство в $L^1(\mu)$. Через $E \otimes_1 B$ мы обозначаем замкнутое подпространство в $L^1(B, \mu)$, порожденное элементами вида $e \otimes b$, где $e \in E$, $b \in B$. Если $G = E^\perp \subset L^\infty(\mu)$, то через $G \boxtimes B^*$ обозначим аннулятор пространства $E \otimes_1 B$ в $L^1(B, \mu)^*$. Легко видеть, что $G \boxtimes B^* = ((L^1(\mu)/E) \widehat{\otimes} B)^*$. Поэтому $G \boxtimes B^*$ отождествляется с пространством ограниченных билинейных форм на $(L^1(\mu)/E) \times B$, т.е. с пространством операторов из B в G . По определению, положим $L^\infty(B^*, \mu) = L^1(B, \mu)^* = (L^1(\mu) \widehat{\otimes} B)^*$. Часто (и практически во всех случаях, которые нам встречаются) пространства $L^\infty(B^*, \mu)$ можно рассматривать как пространство B^* -значных w^* -измеримых ограниченных функций.

§2. Продолжение и интерполяция

В этом параграфе мы докажем одно общее утверждение технического характера о продолжении операторов.

Пусть (U_0, U_1) – совместимая пара банаховых пространств (термин “совместимая” означает, что U_0 и U_1 линейно и непрерывно вложены в некое объемлющее линейно-топологическое пространство). Пусть V_0, V_1 – замкнутые подпространства в U_0 и U_1 соответственно. Пара (V_0, V_1) называется *K-замкнутой* в (U_0, U_1) , если для всякого элемента $v \in V_0 + V_1$ и всякого разложения $v = u_0 + u_1$, где $u_i \in U_i$ ($i = 0, 1$), существует другое разложение $v = v_0 + v_1$, где $v_i \in V_i$ и $\|v_i\|_{U_i} \leq C \|u_i\|_{U_i}$ ($i = 0, 1$; постоянная C не зависит от участвующих векторов).

Полезно отметить, что проверять это свойство достаточно для векторов v , пробегающих какое-нибудь плотное подмножество суммы $V_0 + V_1$.

Пусть U – промежуточное пространство для пары (U_0, U_1) (т.е. $U_0 \cap U_1 \subset U \subset U_0 + U_1$), и пусть $0 < \theta < 1$. Говорят, что U – пространство *интерполяционного типа* θ , если

$$\|x\|_U \leq C \|x\|_{U_0}^{1-\theta} \|x\|_{U_1}^\theta, \quad x \in U_0 \cap U_1.$$

Положим $V = \text{clos}_U(V_0 \cap V_1)$. Доказательство следующей известной леммы приводится лишь ради полноты.

Лемма 2. *Если пара (V_0, V_1) K-замкнута в (U_0, U_1) , а U – пространство интерполяционного типа θ для (U_0, U_1) , то U/V есть пространство интерполяционного типа θ для пары $(U_0/V_0, U_1/V_1)$.*

Доказательство. Чтобы превратить пару $(U_0/V_0, U_1/V_1)$ в совместимую, достаточно вложить естественным образом пространства U_0/V_0 и U_1/V_1 в $(U_0 + U_1)/(V_0 + V_1)$. (Из K -замкнутости следует, что подпространство $V_0 + V_1$ замкнуто в сумме $U_0 + U_1$, и что оба упомянутых вложения – инъекции.) Тогда U/V легко интерпретировать как промежуточное пространство для пары $(U_0/V_0, U_1/V_1)$. Обозначим нормы в пространствах U/V , U_0/V_0 и U_1/V_1 через $\|\cdot\|$, $\|\cdot\|_0$ и $\|\cdot\|_1$ соответственно.

Пусть $x \in U_0 \cap U_1$. Найдем векторы $v_0 \in V_0$ и $v_1 \in V_1$ так, чтобы $\|x\|_i \leq 2\|x - v_i\|_{U_i}$ ($i = 0, 1$; в левой части неравенства имеются в виду нормы фактор-классов, порожденных вектором x). Тогда $v_0 - v_1 = (v_0 - x) - (v_1 - x)$, и из K -замкнутости следует, что $v_0 - v_1 = w_0 - w_1$, где $w_i \in V_i$ и $\|w_i\|_i \leq C\|x - v_i\|_i$ ($i = 0, 1$). Обозначим $u = x - v_0 + w_0 = x - v_1 + w_1$. Тогда

$$\begin{aligned} \|x\| &\leq \|u\|_U \leq C\|u\|_0^{1-\theta}\|u\|_1^\theta = C\|x - v_0 + w_0\|_0^{1-\theta}\|x - v_1 + w_1\|_1^\theta \leq \\ &\leq C'\|x\|_0^{1-\theta}\|x\|_1^\theta. \quad \square \end{aligned}$$

Сформулируем теперь основное утверждение этого параграфа. Пусть (X_0, X_1) – совместимая пара банаевых пространств, причем пересечение $X_0 \cap X_1$ плотно как в X_0 , так и в X_1 . Операторы, подлежащие продолжению, будут принимать значения в некотором w^* -замкнутом подпространстве G пространства $L^\infty(\mu)$, где μ – конечная мера. Положим $E = G^\perp \subset L^1(\mu)$. Потребуем еще, чтобы множество $E \otimes (X_0 \cap X_1)$ было плотно в $(E \otimes_1 X_0) \cap (E \otimes_1 X_1)$ по норме пересечения. Это техническое условие выполнено почти всегда, но в общем случае оно, вероятно, связано с условиями аппроксимации в участвующих пространствах. Однако, если пространство X_1 непрерывно вложено в X_0 – а так будет во всех приложениях в этой статье, – указанное требование выполняется очевидным образом.

Предложение 1. *Пусть Y – замкнутое подпространство в $X_0 \cap X_1$ такое, что нормы $\|\cdot\|_0$ и $\|\cdot\|_1$ эквивалентны на Y . Пусть еще Z – некоторое промежуточное пространство интерполяционного типа θ для пары (X_0, X_1) ($\theta \in (0, 1)$). Предположим, что пара $(E \otimes_1 X_0, E \otimes_1 X_1)$ K -замкнута в $(L^1(X_0, \mu), L^1(X_1, \mu))$.*

Если всякий оператор $T : Y \rightarrow G$ продолжается до оператора из Z в G , то всякий такой оператор T продолжается до оператора из X_0 в G .

Доказательство. Считаем, что $E \neq L^1(\mu)$ (иначе доказывать нечего). Кроме того, можно считать, что $X_0 \cap X_1$ плотно в Z (если нет, заменим пространство Z замыканием в нем пересечения $X_0 \cap X_1$). Существует такая постоянная a , что всякий оператор $T : Y \rightarrow G$ допускает продолжение $\tilde{T} : Z \rightarrow G$ с оценкой $\|\tilde{T}\| \leq a\|T\|$. Отсюда, в частности, следует, что на Y норма пространства Z эквивалентна нормам $\|\cdot\|_0$ и $\|\cdot\|_1$. В дальнейшем считаем, что пространство Y наделено нормой, индуцированной из Z .

Из неравенства Гёльдера легко следует, что $L^1(Z, \mu)$ – пространство интерполяционного типа θ для пары $(L^1(X_0, \mu), L^1(X_1, \mu))$. Из леммы 2 вытекает, что $L^1(Z, \mu)/(E \otimes_1 Z)$ есть пространство интерполяционного типа θ для пары $(L^1(X_0, \mu)/(E \otimes_1 X_0), L^1(X_1, \mu)/(E \otimes_1 X_1))$. Действительно, в нашей ситуации пространство V , фигурирующее в лемме 2, совпадает с $E \otimes_1 Z$: включение $V \subset E \otimes_1 Z$ вытекает из предположения о плотности множества $E \otimes (X_0 \cap X_1)$ в $(E \otimes_1 X_0) \cap (E \otimes_1 X_1)$, а обратное включение – из плотности пересечения $X_0 \cap X_1$ в Z . Та же плотность и стандартное применение двойственности показывают, что тогда $G \boxtimes Z^* \subset (G \boxtimes X_0^*, G \boxtimes X_1^*)_{\theta, \infty}$, т.е. любой элемент Φ из единичного шара пространства $G \boxtimes Z^*$ для любого $t > 0$ допускает представление вида

$$\Phi = \Phi_0 + \Phi_1, \quad \text{где } \Phi_0 \in G \boxtimes X_0^*, \quad \Phi_1 \in G \boxtimes X_1^*, \quad (1)$$

$$\|\Phi_0\|_{G \boxtimes X_0^*} \leq ct^\theta, \quad \|\Phi_1\|_{G \boxtimes X_1^*} \leq ct^{\theta-1}.$$

Пусть $T : Y \rightarrow G$ – оператор с нормой не выше $1/a$. Продолжим его до оператора из Z в G с нормой не выше 1 и разложим соответствующий элемент Φ пространства $G \boxtimes Z^*$ как в (1) (число t будет выбрано несколькими строками ниже). Оператор, соответствующий элементу Φ_0 , действует из X_0 в G и имеет норму не выше ct^θ . Рассмотрим оператор из X_1 в G , соответствующий элементу Φ_1 , и обозначим через T_1 его сужение на Y . Ясно, что $\|T_1\| \leq C't^{\theta-1} \leq 1/(2a)$, если число t зафиксировано достаточно большим.

Доказательство завершается стандартными итерациями: применяем ту же конструкцию к T_1 и т.д. \square

Замечание. В предложении 1 K -замкнутость пары $(E \otimes_1 X_0, E \otimes_1 X_1)$ в $(L^1(X_0, \mu), L^1(X_1, \mu))$ равносильна K -замкнутости пары $(G \boxtimes X_0^*, G \boxtimes X_1^*)$ в $(L^\infty(X_0^*, \mu), L^\infty(X_1^*, \mu))$, см. [14, 15].

 §3. *K*-замкнутость

В этом параграфе мы приведем конкретный набор ситуаций, в которых применимо предложение 1. Нетривиальным для проверки является условие *K*-замкнутости.

В качестве E у нас будет фигурировать подпространство любого из следующих типов в $L^1(\mu)$:

- (a) E рефлексивно;
- (b) $\mu = m$, а $E = H_0^1 \oplus F$, где F рефлексивно.

Теорема 1. *Пусть E – такое, как выше, а $t = t(E)$ в случае (a) и $t = t(F)$ в случае (b). Тогда пара $(E \otimes_1 X_0, E \otimes_1 X_1)$ *K*-замкнута в $(L^1(X_0, \mu), L^1(X_1, \mu))$, если*

- (i) $X_0 = L^1(\lambda), X_1 = L^r(\lambda)$, где λ – конечная мера и $1 < r < t$;
- (ii) $X_0 = L^1(w)/H_0^1(w)$, $X_1 = L^r(w)/H_0^r(w)$, где $1 < r < t$, а плотность w на окружности такова, что $\log w \in BMO$.

Отложим ненадолго доказательство и приведем два следствия (другие применения будут даны в §4).

Следствие 1. *Если E – пространство одного из указанных выше типов (a), (b), то $L^1(\mu)/E$ – GT-пространство котипа 2.*

Как уже отмечалось, этот факт не нов – его новое доказательство приводится лишь как иллюстрация. В предложении 1 положим $X_0 = L^1(0, 1)$, $X_1 = L^r(0, 1)$ (r – как в теореме 1), $Z = L^s(0, 1)$ с $1 < s < r$, а в качестве Y возьмем пространство, натянутое на функции Радемахера. В силу утверждения (i) теоремы 1 и того, что Y дополняемо в Z , все условия предложения 1 выполнены, так что всякий оператор из Y в $G = (L^1(\mu)/E)^* = E^\perp$ продолжается до оператора из $L^1(0, 1)$ в G . Остается сослаться на теорему В. \square

Следствие 2. *Пусть E – как выше, а $G = E^\perp \subset L^\infty(\mu)$. Следующие*

условия эквивалентны.

- 1) Для всякого рефлексивного подпространства K в $L^1(\lambda)$ (λ – не чисто атомная конечная мера) каждый оператор $T : K \rightarrow G$ продолжается до оператора из $L^1(\lambda)$ в G .
- 2) То же, с заменой пространства $L^1(\lambda)$ на $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$.
- 3) $k_q(G) < \infty$ для всех $q \geq 2$.

Доказательство. Утверждение 3) следует как из 1), так и из 2) – в силу описания констант k_p в терминах продолжения операторов в п. 1.1 достаточно заметить, что $L^{q'}$ вкладывается изоморфно как в $L^1(\lambda)$, так и в $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$. Докажем обратные импликации. Пусть выполнено условие 3), и пусть K – рефлексивное подпространство в $L^1(\lambda)$. Согласно п. 1.2, меру λ можно считать p -допустимой для некоторого $p > 1$. В силу материала п. 1.1, всякий оператор $T : K \rightarrow G$ продолжается на $L^r(\lambda)$ при всяком фиксированном $r \in (1, p]$. Осталось сослаться на теорему 1 и предложение 1.

Случай, когда K – рефлексивное подпространство в $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$, рассматривается так же, но с использованием п. 1.3. Надо заметить только, что при $1 < r < \infty$ пространство $L^r(wm)/H^r(wm)$ изоморфно пространству $L^r(\mathbb{T})$. \square

Пусть E – такое, как в п. (b) выше. Если $F = 0$, получаем $G = H^\infty$. Так как $k_q(H^\infty) < \infty$ при $1 < q < \infty$ (см. ссылки в п. 1.1), из следствия 2 выводится теорема А из Введения.

Отметим еще, что, согласно п. 1.3, пространства вида $L^1(m)/E$, где E – такое, как в (b), – это в частности все факторы пространства $L^1(m)/H_0^1$ по его рефлексивным подпространствам.

Приступаем к доказательству теоремы 1. Разобьем его на пункты в соответствии с двумя возможностями для пространства E ((a) и (b)) и двумя – для пары (X_0, X_1) ((i) и (ii)).

(ia) Можно считать, что мера μ r -допустима для E . Воспользуемся тем, что при проверке K -замкнутости можно ограничиться векторами из плотного подмножества суммы соответствующих пространств. Пусть функция f из $E \otimes L^1(\lambda) + E \otimes L^r(\lambda)$ представлена в виде $f = g + h$, где $g \in L^1(L^1(\lambda), \mu)$, $h \in L^1(L^r(\lambda), \mu)$. Обозначим нормы функций g и h в их пространствах через a и b .

Далее, положим

$$\varphi(t) = \int |g(u, t)| d\mu(u), \quad \psi(t) = \int |h(u, t)| d\mu(u).$$

Тогда $\int |f(u, t)| d\mu(u) \leq \varphi(t) + \psi(t)$. Утверждается, что функции $\alpha = f\varphi/(\varphi+\psi)$ и $\beta = f\psi/(\varphi+\psi)$ составляют требуемое разложение функции f .

Действительно, обе функции представляют собой конечные суммы вида $\sum e_j(u)x_j(t)$, где $e_j \in E$. Поэтому достаточно оценить нормы. Так как $\int |\alpha(u, t)| d\mu(u) \leq \varphi(t)$, то $\|\alpha\|_{L^1(L^1(\lambda), \mu)} \leq a$. Что касается функции β , то согласно неравенству Гёльдера

$$\int \left(\int |\beta(u, t)|^r d\lambda(t) \right)^{1/r} d\mu(u) \leq \left(\iint |\beta(u, t)|^r d\mu(u) d\lambda(t) \right)^{1/r}.$$

Так как $\beta(\cdot, t) \in E$ при п.в. t , а мера μ r -допустима для E , то внутренний интеграл справа не превосходит числа

$$C^r \left(\int |\beta(u, t)| d\mu(u) \right)^r \leq C^r \psi(t)^r.$$

В результате получаем

$$\begin{aligned} \|\beta\|_{L^1(L^r(\lambda), \mu)} &\leq C \left(\int \psi(t)^r d\lambda(t) \right)^{1/r} = C \left\| \int |h(u, \cdot)| d\mu(u) \right\|_{L^r(\lambda)} \leq \\ &C \int \|h(u, \cdot)\|_{L^r(\lambda)} d\mu(u) = C b. \quad \square \end{aligned}$$

(ib) На это раз $E = H_0^1 \oplus F$, где пространство F рефлексивно. Пусть $v - r$ -допустимый вес для F . После замены плотности можно считать, что мы имеем дело с пространством $E = H_0^1(vm) \oplus F \subset L^1(vm)$, где нормы пространств $L^1(vm)$ и $L^r(vm)$ эквивалентны на F . Пусть снова функция f из $E \otimes L^1(\lambda) + E \otimes L^r(\lambda)$ представлена в виде $f = g + h$ (как и в предыдущем пункте); по-прежнему обозначаем нормы слагаемых через a и b . Обозначим через P проектор из E на F вдоль $H_0^1(vm)$. Определим φ и ψ ровно теми же формулами, что и в предыдущем случае. Положим

$$\alpha = \frac{(Pf)\varphi}{\varphi + \psi}, \quad \beta = \frac{(Pf)\psi}{\varphi + \psi}$$

(проектор P действует по первой переменной). Так как функции φ и ψ зависят лишь от второй переменной, легко видеть, что

$$\int |\alpha(u, \cdot)|v(u)dm(u) \leq \frac{\varphi}{\varphi + \psi} \int |(Pf)(u, \cdot)|v(u)dm(u) \leq \|P\|\varphi(\cdot)$$

и аналогично

$$\int |\beta(u, \cdot)|v(u)dm(u) \leq \|P\|\psi(\cdot).$$

Из первой оценки сразу следует, что $\|\alpha\|_{L^1(vm \otimes \lambda)} \leq a$. Далее, действуя как в пункте (ia) и используя вторую оценку, находим:

$$\begin{aligned} & \int \left(\int |\beta(u, t)|^r d\lambda(t) \right)^{1/r} v(u) dm(u) \leq \\ & \leq C \int \left(\int |\beta(u, t)|v(u) dm(u) \right)^r d\lambda(t) \right)^{1/r} \leq \\ & \leq C\|P\| \left(\int \psi^r d\lambda \right)^{1/r} \leq C'b. \end{aligned}$$

Итак, $\alpha \in F \otimes L^1(\lambda)$, $\beta \in F \otimes L^r(\lambda)$, и нормы этих функций в указанных пространствах имеют порядок a и b соответственно. Функция $f_1 = f - \alpha - \beta$ лежит в $H_0^1(v) \otimes L^1(\lambda) + H_0^1(v) \otimes L^r(\lambda)$, и в ее разложении $f_1 = (g - \alpha) + (h - \beta)$ слагаемые тоже порядка a и b . Осталось сослаться на K -замкнутость пары $(H_0^1(v) \otimes_1 L^1(\lambda), H_0^1(v) \otimes_1 L^r(\lambda))$ в $(L^1(L^1(\lambda), v), L^1(L^r(\lambda), v))$, см., например, обзор [14]. (В последнем утверждении вес v не играет большой роли, ибо от него можно избавиться обратной заменой плотности.) \square

(iiia) Считаем, что мера μ r -допустима для E . Пусть снова $f = g + h$, где $f \in E \otimes X_0 + E \otimes X_1$, а $g \in L^1(X_0, \mu)$, $h \in L^1(X_1, \mu)$. Сохраним обозначения a и b для соответствующих норм. Поднимаясь из факторов X_0 и X_1 в пространства $L^1(w)$ и $L^r(w)$, приходим к разложению

$$F(u, t) + \eta(u, t) = G(u, t) + H(u, t),$$

где $\|G\|_{L^1(\mu \otimes wm)} \leq 2a$, $\|H\|_{L^1(L^r(\mu), wm)} \leq 2b$, $F \in E \otimes L^1(wm) + E \otimes L^r(wm)$, а

$$\eta(u, \cdot) \in H_0^1(w) + H_0^r(w) \quad \text{для п.в. } u. \tag{2}$$

Нам нужно заметить функции G и H функциями G_1 и H_1 с нормами того же порядка, но лежащими в $E \otimes_1 L^1(wm)$ и $E \otimes_1 L^r(wm)$ соответственно; функция η может при такой замене измениться, но так, чтобы сохранилось соотношение (2).

Положим

$$\varphi_0(t) = \int |G(\cdot, t)| d\mu, \quad \psi_0(t) = \int |H(\cdot, t)| d\mu.$$

Ясно, что $\|\varphi_0\|_{L^1(w)} \leq 2a$, $\|\psi_0\|_{L^r(w)} \leq 2b$. Воспользуемся тем, что пространства $L^1(w)$ и $L^r(w)$ BMO -регулярны (см., например, [14]), и найдем две функции φ и ψ , такие, что $\varphi \geq \varphi_0$, $\psi \geq \psi_0$, $\|\varphi\|_{L^1(w)} \leq Ca$, $\|\psi\|_{L^r(w)} \leq Cb$, $\|\log \varphi\|_{BMO} \leq C$, $\|\log \psi\|_{BMO} \leq C$ (постоянная C зависит лишь от r и величины $\|\log w\|_{BMO}$). Пусть Γ – внешняя функция, для которой $|\Gamma| = \varphi + \psi$ п.в. Из [14, §3] вытекает, что функция Γ допускает представление $\Gamma = \Phi + \Psi$, где Φ и Ψ – функции из класса Смирнова, на границе удовлетворяющие неравенствам $|\Phi| \leq c\varphi$, $|\Psi| \leq c\psi$ (c зависит от тех же параметров, что и C выше).

Пусть еще W – внешняя функция такая, что $|W| = w$. Обозначим через Q ортогональный проектор пространства $L^2(\mathbb{T})$ на $H_0^{2\perp}$. Наконец, положим

$$G_1 = \frac{\Phi(F + \eta)}{\Gamma}, \quad H_1(u, \cdot) = W(\cdot)^{-1/r} Q \left(W(\cdot)^{1/r} \frac{\Psi(\cdot)(F + \eta)(u, \cdot)}{\Gamma(\cdot)} \right). \quad (3)$$

Разность $F - G_1 - H_1$ есть функция, аналитическая по второй переменной и образующаяся в ноль в центре круга. Поэтому достаточно оценить нормы функций G_1 и H_1 . Так как $\int |F + \eta| d\mu \leq |\Gamma|$, то $\int |G_1| d\mu \leq |\Phi|$, поэтому

$$\iint |G_1(u, t)| w(t) dm(t) d\mu(u) \leq c \int \varphi(t) w(t) dt \leq c' a.$$

Что касается функции H_1 , напишем

$$\begin{aligned} & \int \left(\int |H_1(u, t)|^r w(t) dm(t) \right)^{1/r} d\mu(u) \leq \\ & \leq \left(\iint |H_1(u, t)|^r d\mu(u) w(t) dm(t) \right)^{1/r}. \end{aligned}$$

Учитывая, что $Q(W^{1/r}\eta\Psi\Gamma^{-1}) = 0$, видим, что при почти каждом t функция $H_1(\cdot, t)$ лежит в E . Зафиксируем $\alpha \in (0, 1)$. Так как мера μ r -допустима для E , получаем оценку

$$\begin{aligned} \|H_1\|_{L^1(L^r(w), \mu)} &\leq C \left\| \left(\int |H_1(u, \cdot)|^\alpha d\mu \right)^{1/\alpha} \right\|_{L^r(w)} = \\ &= C \left\| \left(\int |Q[W^{1/r}\Gamma^{-1}\Psi(F + \eta)(u, \cdot)]|^\alpha d\mu(u) \right)^{1/\alpha} \right\|_{L^r(\mathbb{T})}. \end{aligned} \quad (4)$$

По теореме Бургейна (см. обзоры [1, 2]), оператор Q действует из $L^r(L^1(\mu), \mathbb{T})$ в $L^r(L^\alpha(\mu), \mathbb{T})$. Поэтому последнее выражение не превосходит числа

$$C' \|W^{1/r}\Psi\Gamma^{-1}[F + \eta]\|_{L^r(L^1(\mu), \mathbb{T})} \leq C'' \|\psi\|_{L^r(w)} \leq C''' b$$

(ибо $\int |F + \eta| d\mu \leq |\Gamma|$). \square

(iib) Теперь снова $E = H_0^1 \oplus F$, где F рефлексивно. После замены плотности (как в начале п. (ib)) можно считать, что $E = H_0^1(v) \oplus F \subset L^1(v)$, где v – r -допустимая плотность для F . Как объяснялось в §1, без потери общности мы можем предположить, что $\log v \in BMO$.

Зафиксируем $\alpha \in (0, 1)$ и обозначим через P проектор из $H_0^\alpha(v) + F$ на F вдоль $H_0^\alpha(v)$. Далее действуем как в предыдущем пункте до формулы (3) включительно. Наряду с функциями G_1 и H_1 введем еще функцию $\tilde{H}_1(\cdot, t) = PH_1(\cdot, t)$. Это определение корректно, поскольку, как и в п. (iia), $H_1(\cdot, t) \in E$ при п.в. t .

Оценка $\|G_1\|_{L^1(L^1(w), vm)} \leq ca$ получается ровно так же, как в (iia). Поскольку $\tilde{H}_1(\cdot, t) \in F$ при п.в. t , вместо (4) можно написать

$$\begin{aligned} \|\tilde{H}_1\|_{L^1(L^1(w), vm)} &\leq C \left\| \left(\int |\tilde{H}_1(u, \cdot)|^\alpha v(u) dm(u) \right)^{1/\alpha} \right\|_{L^r(w)} \leq \\ &\leq C' \left\| \left(\int |H_1(u, \cdot)|^\alpha v(u) dm(u) \right)^{1/\alpha} \right\|_{L^r(w)}, \end{aligned}$$

что, как и в (iia), ведет к оценке $\|H_1\|_{L^1(L^r(w), vm)} \leq C'' b$.

Нетрудно убедиться в том, что $Y \stackrel{\text{def}}{=} F - G_1 - \tilde{H}_1 \in H_0^1(v) \otimes_1 L^1(w) + L^1(v) \otimes_1 H_0^1(w)$. Вернемся к фактор-классам по модулю

функций, аналитических по второй переменной и образующихся в нуль в центре круга (результат такой факторизации будем обозначать квадратными скобками). Из последнего соотношения вытекает, что $y \stackrel{\text{def}}{=} [Y] \in H_0^1(v) \otimes_1 X_0 = H_0^1(v) \otimes_1 X_0 + H_0^1(v) \otimes_1 X_1$. Кроме того,

$$y = g_1 + h_1, \quad \text{где} \quad g_1 = g - [G_1], \quad h_1 = h - [\theta_1],$$

так что слагаемые имеют нормы порядка a и b в пространствах $L^1(X_0, v)$ и $L^1(X_1, v)$ соответственно. Так как $\log w, \log v \in BMO$, из [16] следует, что в этом разложении функции g_1 и h_1 можно заменить функциями того же порядка, но лежащими в $H^1(v) \otimes_1 X_0$ и $H^1(v) \otimes_1 X_1$ соответственно. Это завершает доказательство. \square

§4. ПРОСТРАНСТВА С РЕФЛЕКСИВНЫМ АННУЛЯТОРОМ

Обозначим через X либо $L^1(\mu)$, где μ – не чисто дискретная вероятностная мера, либо $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$. Пусть F – рефлексивное подпространство в X . Тогда X/F – GT -пространство котипа 2 (см. ссылки во Введении или следствие 1 в §3). Положим $G = (X/F)^*$. Тогда о G можно думать как о произвольном w^* -замкнутом подпространстве в $L^\infty(\mu)$ или H^∞ с рефлексивным аннулятором. Нас интересует, когда утверждение, аналогичное теореме А, верно с заменой пространства H^∞ на G . В какой-то мере ответ содержится в следствии 2 в §3. Однако в действительности можно сказать гораздо больше.

Теорема 2. *Пусть пространство G – такое, как указано выше. Следующие условия эквивалентны.*

- (i) Для всякого рефлексивного подпространства E в $L^1(\lambda)$ (λ – не чисто атомная вероятностная мера) всякий оператор $T : E \rightarrow G$ продолжается до оператора \tilde{T} : $L^1(\lambda) \rightarrow G$.
- (ii) То же, с заменой пространства $L^1(\lambda)$ на $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$.
- (iii) $k_p(G) < \infty$ для всякого $p \in [2, \infty)$.
- (iv) Пространство $F = G_\perp \subset X$ гильбертово. Кроме того, если $1 < q \leq 2$ и ν – любая q -допустимая мера для F (соответственно, a – любая q -допустимая плотность для F , если $X = L^1(\mathbb{T})/H_0^1$), то F дополняемо в $L^q(\nu)$ (в $L^q(a)/H_0^q(a)$).

- (v) Существуют $q \in (1, 2]$, сколь угодно близкие к единице и такие, что для некоторого $s \in (q, 2]$ пространство F обладает s -допустимой мерой ν (s -допустимой плотностью a такой, что $\log a \in BMO$), для которых F дополняемо в $L^q(\nu)$ (в $L^q(a)/H_0^q(a)$).

В утверждениях (iv) и (v) допущена некоторая вольность — речь идет, разумеется, о дополняемости образа пространства F при замене плотности, см. §1.

Мы видим, что утверждения (i) и (ii) неверны всякий раз, когда F не является гильбертовым с точностью до перенормировки, а также во многих случаях, когда F является таковым.

Переходя к доказательству, отметим, что эквивалентности (i) \iff (iii) составляют содержание следствия 2 в §3. Очевидно, что (iv) \implies (v). Мы покажем, что (iii) \implies (iv), (v) \implies (i) и (v) \implies (ii) (это завершит доказательство).

(iii) \implies (iv) Рассмотрим сначала случай, когда G — подпространство в $L^\infty(\mu)$ с рефлексивным аннулятором F в $L^1(\mu)$. Будем считать саму меру μ q -допустимой для F для некоторого $q \in (1, 2)$. Пусть p — показатель, сопряженный с q . Пусть i — тождественное вложение пространства G в его замыкание $G_{p,\mu}$ в $L^p(\mu)$. Реализуем $L^\infty(\mu)$ как пространство $C(K)$. Так как оператор i p -суммирующий и $k_p(G) < \infty$, то i является p -интегральным и потому включается в следующую коммутативную диаграмму:

$$\begin{array}{ccccc} G & \xrightarrow{i} & G_{p,\mu} & \xrightarrow{j} & L^p(\mu) \\ \downarrow & & \uparrow u & & \\ C(K) & \xrightarrow{id} & L^p(\rho) & & \end{array} \quad (5)$$

Здесь id и j — тождественные вложения, а u — ограниченный оператор. Без потери общности считаем, что $\rho \geq \mu$ (и $\|\rho\| \leq 2$). Тогда $d\rho = bd\rho$, где $b \in L^1(\rho)$, $0 \leq b \leq 1$. Рассмотрим оператор $v = (ju)^*: L^q(\mu) \rightarrow L^q(\rho)$. Если $g \in C(K)$ и $\psi \in L^q(\mu)$, то

$$\int v(\psi)gd\rho = \int \psi(ju)(g)d\mu = \int \psi(ju)(g)bd\rho. \quad (6)$$

Заставив g пробегать пространство G (тогда $(ju)g = g$), мы видим, что мера $(b\psi - v(\psi))d\rho$ ортогональна пространству G , т.е. лежит в $F \subset L^1(\mu)$. В частности, все такие меры имеют нулевую

вариацию на некотором борелевском носителе e сингулярной части меры ρ по отношению к μ . Следовательно,

$$\chi_{K \setminus e} b^{-1}(b\psi - v(\psi)) d\mu \perp G,$$

так что оператор $Q : \psi \mapsto \chi_{K \setminus e} b^{-1}(b\psi - v(\psi))$ отображает пространство $L^q(\mu)$ в F . Так как образ оператора u лежит в $G_{p,\mu}$, из формулы (6) следует, что $v(\psi) = 0$, если $\psi \in F$. Значит, Q – проектор из $L^q(\mu)$ на F . Осталось сослаться на лемму 1 (п. 1.2).

Пусть теперь G – подпространство в H^∞ (так что $F \subset L^1(\mathbb{T})/H_0^1$). Обозначим через G_0 пересечение пространства G с диск-алгеброй C_A (если стандартным образом вложить пространство $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$ в C_A^* , G_0 окажется аннулятором пространства F в C_A). Пространство G_0^{**} есть прямая сумма пространства G и некоторого L^∞ -пространства, откуда видно (см. [9]), что $k_p(G^0) \leq k_p(G) < \infty$, $2 \leq p < \infty$.

Пусть $p > 2$, q – показатель, сопряженный с p , а a – q -допустимый вес для F . Сделав замену плотности как в п. 1.3, мы можем считать F подпространством в $L^1(a)/H_0^1(a)$; прообраз этого подпространства при факторотображении распадается в прямую сумму $H_0^1(a) \oplus F_1$, где на F_1 эквивалентны нормы пространств $L^1(a)$ и $L^q(a)$. Обозначим через P проектор из $H_0^1(a) + F_1$ на F_1 вдоль $H_0^1(a)$. Пусть A – внешняя функция, для которой $|A| = a$ п.в. Двойственность между $C(\mathbb{T})$ и $L^1(a)$ будем задавать с помощью билинейной формы $\langle f, g \rangle = \int fg Adm$. Тогда G_0 совпадет с аннулятором пространства $H_0^1(a) \oplus F_1 \subset L^1(a)$.

Пусть $G_{p,a}$ – замыкание пространства G_0 в $L^p(a)$, $i : G_0 \rightarrow G_{p,a}$ – тождественное вложение. Возникает диаграмма, аналогичная диаграмме (5):

$$\begin{array}{ccccc} G_0 & \xrightarrow{i} & G_{p,a} & \xrightarrow{j} & L^p(a) \\ \downarrow & & \uparrow u & & \\ C(\mathbb{T}) & \longrightarrow & L^p(\rho). & & \end{array}$$

Как и ранее, здесь $\rho \geq am$. Выберем борелевскую функцию b , $0 \leq |b| \leq 1$, такую что $Am = b\rho$. Продолжая, как в предыдущем случае, придем к отображению $Q : \psi \mapsto \chi_{\mathbb{T} \setminus e} b^{-1}(b\psi - v(\psi))A$ пространства $L^q(a)$ в $H_0^1(am) \oplus F_1$. Легко видеть, что оператор PQ проектирует $L^q(a)$ на F_1 (и переводит в нуль пространство $H_0^2(a)$). Дальнейшее очевидно.

Для доказательства импликаций $(v) \Rightarrow (i)$ и $(v) \Rightarrow (ii)$ понадобится следующая лемма.

Лемма 3. Пусть любое из пространств X и Y – это либо $L^1(\mu)$ (μ – не чисто атомная вероятностная мера), либо $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$, и пусть A и B – рефлексивные подпространства в X и Y . Рассмотрим аннуляторы A^\perp и B^\perp в X^* и Y^* , соответственно. Следующие утверждения эквивалентны.

- (a) Всякий оператор $T : A \rightarrow B^\perp$ допускает продолжение $\tilde{T} : X \rightarrow B^\perp$.
- (b) Всякий оператор $T : B \rightarrow A^\perp$ допускает продолжение $\tilde{T} : Y \rightarrow A^\perp$.

Доказательство. Предположим, что верно утверждение (а). Рассмотрим оператор $T : B \rightarrow A^\perp$. Его можно продолжить до оператора $S : Y \rightarrow X^*$ (это тривиально, если $X^* = L^\infty(\mu)$; если же $X^* = H^\infty$, нужно применить теорему А). Нам нужно изменить S так, чтобы значения нового оператора не выходили за пределы пространства A^\perp . Для этого рассмотрим факторотображение $\alpha : X^* \rightarrow X^*/A^\perp$ и заметим, что $\alpha S|_B = 0$. Следовательно (см. диаграмму), $\alpha S = S_1 \beta$, где $\beta : Y \rightarrow Y/B$ – факторотображение, а S_1 – некоторый оператор.

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{S} & X^* \\ \downarrow \beta \quad S_2 \nearrow & & \downarrow \alpha \\ Y/B & \xrightarrow{S_1} & X^*/A^\perp \end{array}$$

Утверждается, что S_1 можно поднять до оператора S_2 (как указано на диаграмме: $S_1 = \alpha S_2$). Если это установлено, положим $\tilde{T} = S - S_2 \beta$. Тогда \tilde{T} продолжает T (поскольку $S_2 \beta|_B = 0$) и принимает значения в A^\perp (поскольку $\alpha \tilde{T} = \alpha S - \alpha S_2 \beta = \alpha S - S_1 \beta = 0$).

Чтобы построить S_2 , перейдем к сопряженным операторам, учитывая, что пространство X^*/A^\perp рефлексивно:

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ & \swarrow R & \uparrow j \\ B^\perp & \xleftarrow{S_1^*} & A \end{array}$$

Здесь j – тождественное вложение, а продолжение R существует в силу условия (а). Осталось положить $S_2 = R^*|_{(Y/B)}$.

Теперь импликации $(v) \Rightarrow (i)$ и $(v) \Rightarrow (ii)$ легко получаются: лемма показывает, что вместо того, чтобы продолжать на $L^1(\lambda)$ (или $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$) все операторы, действующие из E в G , можно продолжать на $L^1(\nu)$ (на $L^1(\mathbb{T})/H_0^1$) на все операторы, действующие из F в E^\perp . Поскольку F дополнено в $L^q(\nu)$ (в $L^q(a)/H_0^q(a)$), последнее возможно ввиду предложения 1.

Замечание. В случае $X = L^1(\mu)$ теорема 2 была опубликована в препринте [17]. Нетрудно сформулировать и доказать вариант теоремы 2, в котором условия (i) и (ii) выполнены лишь для подпространств E , удовлетворяющих требованию $t(E) > r$ (r – фиксированное число из отрезка $[1, 2]$), а прочие условия изменены соответствующим образом. Для случая $X = L^1(\mu)$ такая формулировка была дана в [17].

ЛИТЕРАТУРА

1. M. Déchamps-Gondim, *Analyse harmonique, analyse complexe, et géométrie des espaces de Banach (d'après Jean Bourgain)*. Astérisque, **121–122** (1985), 171–195.
2. С. В. Кисляков, *Абсолютно суммирующие операторы на диске-алгебре*. Алгебра и Анализ, **3**, № 4 (1991), 1–77.
3. J. Bourgain, *New Banach space properties of the disc algebra and H^∞* . Acta Math., **152** (1984), 1–46.
4. J. Diestel, H. Jarchow, and A. Tonge, *Absolutely summing operators*. Cambridge studies in advanced mathematics, v. 43. Cambridge University press, Cambridge, 1995.
5. G. Pisier, *Counterexamples to a conjecture of Grothendieck*. Acta Math., **151** (1983), 181–208.
6. G. Pisier, *Factorization of linear operators and geometry of Banach spaces*. Reg. Conf. Ser. in Math., no. 60, Amer. Math. Soc., 1986.
7. G. Pisier, *Une nouvelle classe des espaces de Banach vérifiant le théorème de Grothendieck*. Ann. Institut Fourier (Grenoble), **28**, No. 1 (1978), 69–90.
8. С. В. Кисляков, *О пространствах с “малым” аннулятором*. Зап. научн. семин. ЛОМИ, **65** (1976), 192–195.
9. A. Pełczyński, *Banach spaces of analytic functions and absolutely summing operators*. Conf. Board of Math. Sci., No. 30. Amer. Math. Soc., Providence, 1977.
10. С. В. Кисляков, *Два замечания по поводу равенства $\Pi_p(X, \cdot) = I_p(X, \cdot)$* . Зап. научн. семин. ЛОМИ, **113** (1981), 135–148.
11. B. Maurey, *Théorèmes de factorisation pour les opérateurs linéaires à valeurs dans les espaces L_p* . Astérisque, **11** (1974).
12. M. I. Kadec, A. Pełczyński, *Bases, locunary sequences and complemented subspaces in the spaces L_p* . Studia Math., **21** (1961/62), 161–176.

-
13. A. Pełczyński, H. P. Rosenthal, *Localization technique in L_p -spaces*. Studia Math., **52** (1974/75), 263–289.
14. S. V. Kisliakov, *Interpolation of H^p -spaces: some recent developments*. Israel Math. Conf. Proceedings, **13** (1999), 102–140.
15. G. Pisier, *Interpolation between H^p -spaces and noncommutative generalizations I*. Pacif. J. Math., **155** (1992), 341–368.
16. S. V. Kisliakov, *Interpolation involving bounded bianalytic functions*. In: Operator theory: advances and applications, Vol. 113, Birkhäuser Verlag, Basel, 2000.
17. S. V. Kisliakov, *Extension theorem for spaces with reflexive annihilator*. Department of Math., Chalmers University of Technology-Göteborg University, Preprint 2000:3.

Kislyakov S. V. Extension of operators defined on reflexive subspaces of L^1 and L^1/H^1 .

Interpolation theory is used to develop a general pattern for proving extension theorems mentioned in the title. In the case where the range space G is a w^* -closed subspace of L^∞ or H^∞ with reflexive annihilator F , a necessary and sufficient condition on G is found for such an extension to be always possible. Specifically, F must be Hilbertian and become complemented in L^p ($1 < p \leq 2$) after a suitable change of density.

Санкт-Петербургское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова РАН

Поступило 28 июля 2000 г.