



# Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

Н. А. Исаченко, О предельных множествах свободных сходящихся групп, *Сиб. матем. журн.*, 2002, том 43, номер 1, 70–75


Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением

<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 18.97.14.85

20 марта 2025 г., 18:01:17



## О ПРЕДЕЛЬНЫХ МНОЖЕСТВАХ СВОБОДНЫХ СХОДЯЩИХСЯ ГРУПП

Н. А. Исаченко

**Аннотация:** Изучаются предельные множества сходящихся групп, и доказыва-  
ется, что предельное множество свободной разрывной кокомпактной сходящейся  
группы с инвариантной компонентой области разрывности является дисконтинуу-  
мом. Библиогр. 7.

### Введение

Сходящиеся группы были введены Ф. Герингом и Дж. Мартином [1] как естественное обобщение мёбиусовых групп. Класс таких групп достаточно широк, в частности, он включает в себя так называемые равномерно квазиконформные группы, т. е. группы квазиконформных гомеоморфизмов пополненного евклидова пространства на себя, коэффициенты квазиконформности которых ограничены в совокупности.

Сходящиеся группы, являясь обобщением мёбиусовых групп, наследуют многие их свойства (см. [1]). В то же время класс сходящихся групп существенно шире. В [2] доказано существование равномерно квазиконформных групп, которые даже чисто алгебраически не могут быть изоморфны мёбиусовым.

В настоящей работе изучаются предельные множества свободных сходящихся групп и доказывается, что при достаточно естественных ограничениях предельное множество свободной разрывной сходящейся группы является дисконтинуумом.

### 1. Определения

Пусть  $\mathbf{S}^n = \mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$  — расширенное  $n$ -мерное евклидово пространство, отождествленное с  $n$ -мерной сферой посредством стереографической проекции. Группу  $G$  гомеоморфизмов  $\mathbf{S}^n$  на себя будем называть *сходящейся*, если из любого бесконечного множества  $F \subset G$  можно выбрать последовательность  $\{g_k\}$  такую, что будет выполнено одно из следующих условий:

- (i) существует гомеоморфизм  $f : \mathbf{S}^n \rightarrow \mathbf{S}^n$  такой, что  $g_k$  сходятся к  $f$  равномерно на  $\mathbf{S}^n$ ;
- (ii) существуют точки  $x \in \mathbf{S}^n$ ,  $y \in \mathbf{S}^n$  (не обязательно различные) такие, что  $g_k(z)$  сходятся к  $y$  и  $g_k^{-1}(z)$  сходятся к  $x$  равномерно на компактах в  $\mathbf{S}^n \setminus \{x\}$  и  $\mathbf{S}^n \setminus \{y\}$  соответственно.

Относительно топологии равномерной сходимости на компактах всякая сходящаяся группа является топологической группой. Сходящаяся группа называется *дискретной*, если единичный элемент изолирован в этой топологии.

---

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 96-01-01523).

Несложно видеть, что это эквивалентно тому, что для такой группы выполнено только условие (ii).

Пусть  $G$  — сходящаяся группа, действующая в  $\mathbf{S}^n$ , будем говорить, что  $G$  действует разрывно в точке  $x \in \mathbf{S}^n$ , если существует окрестность  $U(x) \subset \mathbf{S}^n$  точки  $x$  такая, что  $U(x) \cap g(U(x)) \neq \emptyset$  не более чем для конечного числа элементов  $g \in G$ . Множество всех таких точек называется *областью разрывности* и обозначается через  $\Omega(G)$ , а множество  $\Lambda(G) = \mathbf{S}^n \setminus \Omega(G)$  называется *предельным множеством группы  $G$* . Группа  $G$  называется *разрывной*, если  $\Omega(G) \neq \emptyset$ .

Приведем необходимые в дальнейшем сведения из трехмерной топологии и теории препятствий.

Пусть  $M$  — трехмерное многообразие. По теореме Мойза [3] на многообразии  $M$  можно ввести кусочно-линейную структуру. Поэтому в дальнейшем будем считать, что на  $M$  зафиксирована некоторая кусочно-линейная структура и все отображения являются кусочно-линейными.

Компактное двумерное многообразие  $S \subset M$  (поверхность в  $M$ ) называется *двусторонней вложенной поверхностью в  $M$* , если  $S$  разбивает свою регулярную окрестность в  $M$ . Если  $S$  — замкнутая поверхность в  $\mathbf{S}^3$ , то *внутренностью  $S$*  назовем множество в  $\mathbf{S}^3$ , ограниченное  $S$  и не содержащее точку  $\infty$ .

Пусть  $M$  и  $N$  — многообразия,  $\pi_1(M)$  и  $\pi_1(N)$  — их фундаментальные группы. Пусть  $f : M \rightarrow N$  — непрерывное отображение. Через  $f_*$  будем обозначать гомоморфизм  $\pi_1(M)$  в  $\pi_1(N)$ , индуцированный отображением  $f$ .

Пусть  $X$  — комплекс,  $L$  — его подкомплекс,  $x_0 \in L$ ,  $Y$  — комплекс такой, что  $\pi_k(Y, y_0) = 0$  для всех  $k \geq 2$ . Пусть  $f : L \rightarrow Y$  — непрерывное отображение, и  $f(x_0) = y_0$ . Далее  $f_* : \pi_1(L, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ ,  $i_* : \pi_1(L, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$  — гомоморфизмы, индуцированные отображением  $f$  и тождественным вложением  $i : L \rightarrow X$ .

**Лемма 1** [4]. *При заданных выше условиях отображение  $f$  продолжается до непрерывного отображения  $\hat{f} : X \rightarrow Y$  тогда и только тогда, когда существует гомоморфизм  $\theta : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ , замыкающий диаграмму*

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(L, x_0) & \xrightarrow{f_*} & \pi_1(Y, y_0) \\ i_* \searrow & & \nearrow \theta \\ & \pi_1(X, x_0) & \end{array}$$

в коммутативную. Причем для любого такого гомоморфизма  $\theta$  существует продолжение  $\hat{f} : X \rightarrow Y$  такое, что  $\hat{f}_* = \theta$ .

## 2. Предельные множества свободных сходящихся групп

В теории клейновых групп, т. е. разрывных групп мёбиусовых преобразований  $\mathbf{S}^n$ , известен следующий результат Н. А. Гусевского [5].

**Теорема 1.** *Пусть  $\Gamma$  — клейнова геометрически конечная свободная ранга  $m \geq 2$  группа без параболических элементов, действующая в  $\mathbf{S}^3$ . Тогда ее предельное множество гомеоморфно канторовскому дисконтинууму.*

Условия геометрической конечности и отсутствия параболических элементов существенны в теореме 1. Определение геометрической конечности клейновой группы  $\Gamma$  использует продолжение действия  $\Gamma$  в  $\mathbb{R}_+^4$ . Поскольку не известно (по-видимому, и не верно), возможно ли действие всякой сходящейся группы продолжить в  $\mathbb{R}_+^4$ , то для доказательства аналогичного утверждения для

свободных сходящихся групп требуются ограничения, заменяющие условия геометрической конечности и отсутствия параболических элементов. Оказывается, что вполне естественными условиями являются наличие инвариантной компоненты  $\Omega_0 \in \Omega(G)$  области разрывности и компактность фактор-многообразия  $M = \Omega_0/G$ .

**Теорема 2.** Пусть  $G$  — сходящаяся разрывная свободная ранга  $m \geq 2$  группа, действующая в  $\mathbf{S}^3$  и имеющая инвариантную компоненту  $\Omega_0$  области разрывности, и фактор-многообразие  $M = \Omega_0/G$  компактно. Тогда предельное множество  $\Lambda(G)$  гомеоморфно канторовскому дисконтинууму.

Рассмотрим следующую ситуацию.

Пусть  $S_1, S'_1, S_2, S'_2, \dots, S_m, S'_m$  — замкнутые поверхности в  $\mathbf{S}^3$ , причем замыкания их внутренностей не пересекаются,  $S_i$  гомеоморфна  $S'_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, m$ . Пусть, далее,  $g_1, g_2, \dots, g_m$  — гомеоморфизмы  $\mathbf{S}^3$  на себя такие, что  $g_i(\overline{\text{ext}(S_i)}) = \overline{\text{int}(S'_i)}$ ,  $i = 1, 2, \dots, m$ . Допустим, что при этом группа  $G = \langle g_1, g_2, \dots, g_m \rangle$  сходящаяся. В п. 4 будет показано, что в этом случае  $G$  свободная, разрывная и ее предельное множество гомеоморфно канторовскому дисконтинууму.

Тем самым для доказательства теоремы 2 достаточно построить область  $D \subset \mathbf{S}^3$ , ограниченную  $2m$  попарно не пересекающимися поверхностями  $S_1, S'_1, S_2, S'_2, \dots, S_m, S'_m$ , и отображения  $g_1, g_2, \dots, g_m$  такие, что  $g_i(\overline{\text{ext}(S_i)}) = \overline{\text{int}(S'_i)}$ , при этом  $g_1, g_2, \dots, g_m$  порождают нашу группу  $G$ .

Последующие два пункта посвящены доказательству теоремы 2. В п. 3 для группы  $G$  мы строим область  $D$ , о которой говорилось выше. В п. 4, как уже сказано, докажем, что предельное множество  $\Lambda(G)$  гомеоморфно канторовскому дисконтинууму.

### 3. Построение области $D$

**Лемма 2.** Если выполнены условия теоремы 2, то существуют область  $D$  и гомеоморфизмы  $g_1, g_2, \dots, g_m$  такие, что

- (1)  $D$  ограничена  $2m$  поверхностями  $S_1, S'_1, S_2, S'_2, \dots, S_m, S'_m$ ;
- (2) замыкания внутренностей поверхностей  $S_1, S'_1, S_2, S'_2, \dots, S_m, S'_m$  попарно не пересекаются;
- (3)  $g_i(\overline{\text{ext}(S_i)}) = \overline{\text{int}(S'_i)}$ ,  $i = 1, 2, \dots, m$ ;
- (4)  $g_1, g_2, \dots, g_m$  порождают группу  $G$ .

**Доказательство.** Рассмотрим накрытие  $p : \Omega_0 \rightarrow M = \Omega_0/G$ . Пусть  $x_0 \in M$ ,  $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$ ,  $\tau : \pi_1(M, x_0) \rightarrow G$  — естественный эпиморфизм и  $p_* : \pi_1(\Omega_0, \tilde{x}_0) \rightarrow \pi_1(M, x_0)$  — естественный гомоморфизм, индуцированные накрытием  $p : \Omega_0 \rightarrow M$ . Пусть  $H = p_*(\pi_1(\Omega_0, \tilde{x}_0))$  и  $g_1, g_2, \dots, g_m$  — свободные порождающие группы  $G$ . Для каждого  $g_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, m$ , выберем по представителю  $\tilde{g}_i \in \tau^{-1}(g_i)$ . Тогда  $\pi_1(M, x_0) = \langle \tilde{g}_1, \tilde{g}_2, \dots, \tilde{g}_m, H \rangle$ .

В многообразии  $M$  выберем простые петли  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ , представляющие в  $\pi_1(M, x_0)$  элементы  $\tilde{g}_1, \tilde{g}_2, \dots, \tilde{g}_m$  соответственно. Обозначим через  $L$  комплекс в  $M$ , образованный петлями  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ .

Рассмотрим комплекс  $Y$ , представляющий собой букет из  $m$  окружностей  $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ , касающихся друг друга в точке  $y_0$ . Фундаментальная группа  $\pi_1(Y, y_0)$  является свободной ранга  $m$ , т. е. изоморфна группе  $G$ . Пусть  $\varphi : G \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$  — изоморфизм ( $\varphi(g_i) = [Y_i]$ ).

Пусть  $f : L \rightarrow Y$  — гомеоморфизм,  $f(\alpha_i) = Y_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, m$ ,  $f(x_0) = y_0$ . Многообразие  $M$ , комплексы  $L$  и  $Y$  и отображение  $f$  полностью удовлетворяют

условиям леммы 1, причем роль гомоморфизма  $\theta$  играет эпиморфизм  $\varphi \circ \tau$ . Таким образом, существует непрерывное отображение  $\hat{f} : M \rightarrow Y$  такое, что  $\hat{f}|_L = f$  и  $\hat{f}$  индуцирует эпиморфизм  $\tau : \pi_1(M, x_0) \rightarrow G$ , т. е.  $\hat{f}_* = \tau$ .

На каждой из окружностей  $Y_i$  выберем по точке  $y_i \in Y_i$ ,  $y_i \neq y_0$ . Точки  $y_i$  можно считать регулярными в том смысле, что  $\hat{f}^{-1}(y_i)$  — набор правильно вложенных двумерных многообразий, и для каждой поверхности  $S \subset \hat{f}^{-1}(y_i)$  существуют окрестности  $S \times [-1, 1] \subset M$  и  $\{y_i\} \times [-1, 1] \subset Y_i$  такие, что для всякой точки  $q \in S$  отображение  $\hat{f}$ , ограниченное на  $\{q\} \times [-1, 1]$ , представляет собой гомеоморфизм на  $\{y_i\} \times [-1, 1]$ . В самом деле, это следует из леммы Сарда, поскольку по теореме Мойза [3] на  $M$  можно ввести гладкую структуру и отображение  $\hat{f}$  можно считать гладким.

Рассмотрим прообраз  $\hat{f}^{-1}(y_i)$  точки  $y_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, m$ . В нем имеется поверхность, которую обозначим через  $S_i$ , пересекающая петлю  $\alpha_i$ . Действительно, на  $\alpha_i$  существует точка  $x$  такая, что  $\hat{f}(x) = y_i$ , и, следовательно,  $x$  лежит на одной из компонент  $\hat{f}^{-1}(y_i)$ . Так как точка  $y_i$  регулярная, а сужение  $\hat{f}$  на  $\alpha_i$  — гомеоморфизм, петля  $\alpha_i$  пересекает  $S_i$  ровно в одной точке. Очевидно, что поверхности  $S_i$  и  $S_j$  не пересекаются при  $i \neq j$ .

Рассмотрим компоненту поднятия  $p^{-1}(S_i)$  поверхности  $S_i$  и обозначим ее через  $\tilde{S}_i$ .

**Лемма 3.** Сужение отображения  $p$  на  $\tilde{S}_i$  — гомеоморфизм.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Действительно, поверхность  $S_i$  с помощью  $\hat{f}$  отображается в точку, и, значит,  $\hat{f}_*(i_*(\pi_1(S_i))) = 1$ . Но  $\hat{f}$  индуцирует естественный эпиморфизм  $\tau : \pi_1(M, x_0) \rightarrow G$ . Следовательно, если петля  $\alpha$  содержится в  $S_i$ , то она представляет элемент  $p_*(\pi_1(\Omega_0, \tilde{x}_0))$ , а поэтому ее поднятие  $\tilde{\alpha} \subset \tilde{S}_i$  также является петлей, т. е. на  $\tilde{S}_i$  нет эквивалентных относительно  $G$  точек, тем самым сужение  $p$  на  $\tilde{S}_i$  — гомеоморфизм.  $\square$

В  $\Omega_0$  существует единственный путь  $\tilde{\alpha}_i$ , проходящий через  $\tilde{x}_0$ , накрывающий путь  $\alpha_i$  и имеющий начало на одной компоненте  $p^{-1}(S_i)$ , а конец — на другой. Обозначим эти компоненты через  $\tilde{S}_i$  и  $\tilde{S}'_i$ .

Так как путь  $\tilde{\alpha}_i$  накрывает путь  $\alpha_i$ , а  $\alpha_i$  представляет в  $\pi_1(M, x_0)$  элемент  $\tilde{g}_i$ , то  $g_i(\tilde{S}_i) = \tilde{S}'_i$ .

Можно считать, что точка  $\infty$  лежит в области разрывности группы  $G$ . Поэтому точку  $\tilde{x}_0$  можно выбрать так, что  $\text{int}(\tilde{S}'_i) \subset \text{ext}(\tilde{S}_i)$  и  $\tilde{x}_0 \in \text{ext}(\tilde{S}'_i) \cap \text{ext}(\tilde{S}_i)$ .

**Лемма 4.**  $g_1(\text{ext}(\tilde{S}_1)) = \text{int}(\tilde{S}'_1)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Точка  $\tilde{x}_0$  под действием  $g_1$  отображается внутрь  $\tilde{S}'_1$ . Действительно, допустим, что  $g_1(\tilde{x}_0) \in \text{ext}(\tilde{S}'_1)$ . Рассмотрим путь  $\alpha^*$  от точки  $\tilde{x}_0$  до  $g_1(\tilde{x}_0)$ , накрывающий путь  $\alpha_1$ . Так как индекс пересечения  $\alpha_1$  с  $S_1$  равен единице, а сужение  $p$  на  $\tilde{S}'_1$  — гомеоморфизм, то индекс пересечения  $\alpha^*$  с  $\tilde{S}'_1$  также равен единице. Но концы пути  $\alpha^*$  ( $\tilde{x}_0$  и  $g_1(\tilde{x}_0)$ ) лежат во внешности поверхности  $\tilde{S}'_1$ , которая, очевидно, разбивает  $\mathbf{S}^3$ , и потому индекс пересечения  $\alpha^*$  с  $\tilde{S}'_1$  равен нулю. Противоречие; следовательно,  $g_1(\tilde{x}_0) \in \text{int}(\tilde{S}'_1)$ .

Пусть  $x \in \text{ext}(\tilde{S}_1)$ . Соединив  $x$  с  $\tilde{x}_0$  путем в  $\text{ext}(\tilde{S}_1)$  и проведя стандартные рассуждения с покрытием пути шарами, получаем, что  $g_1(x) \in \text{int}(\tilde{S}'_1)$ .  $\square$

Теперь рассмотрим поверхности  $\tilde{S}_2$  и  $\tilde{S}'_2$ . Из тех же соображений, что и для  $\tilde{S}_1$  и  $\tilde{S}'_1$ , можно считать, что  $\text{int}(\tilde{S}'_2) \subset \text{ext}(\tilde{S}_2)$  и  $g_2(\text{ext}(\tilde{S}_2)) = \text{int}(\tilde{S}'_2)$ . Кроме того, ни одна из поверхностей  $\tilde{S}_2$  и  $\tilde{S}'_2$  не может лежать ни внутри  $\tilde{S}_1$ , ни внутри  $\tilde{S}'_1$ , так как в противном случае путь  $\tilde{\alpha}_2$  пересекал бы поверхность  $\tilde{S}_1$  или  $\tilde{S}'_1$  и, следовательно, путь  $\alpha_2$ , накрываемый путем  $\tilde{\alpha}_2$ , пересекал бы поверхность  $S_1$ .

Повторяя рассуждения для остальных поверхностей  $\tilde{S}_3, \tilde{S}'_3, \dots, \tilde{S}_m, \tilde{S}'_m$ , получим набор из  $2m$  поверхностей, замыкания внутренностей которых попарно не пересекаются. При этом  $g_i(\text{ext}(\tilde{S}_i)) = \text{int}(\tilde{S}'_i)$  и  $g_1, \dots, g_m$  порождают группу  $G$ . Таким образом, построена область  $D$  со свойствами (1)–(4).  $\square$

#### 4. Гомеоморфность предельного множества канторову дисконтинууму

В этом пункте будет доказана

**Лемма 5.** Пусть  $S_1, S'_1, S_2, S'_2, \dots, S_m, S'_m$  — замкнутые поверхности, ограничивающие в  $\mathbf{S}^3$  область  $D$ , замыкания внутренностей которых попарно не пересекаются. Пусть, далее,  $g_1, \dots, g_m$  — гомеоморфизмы  $\mathbf{S}^3$  на себя такие, что  $g_i(\text{ext}(S_2)) = \text{int}(S'_i)$ . Тогда группа  $G = \langle g_1, \dots, g_m \rangle$  свободная и разрывная. Если, кроме того,  $G$  — сходящаяся группа, то ее предельное множество  $\Lambda(G)$  гомеоморфно канторовскому дисконтинууму.

**Доказательство.** Утверждение, что  $G$  свободна и разрывна, вполне очевидно. В самом деле, пусть  $x \in D$  и  $U(x)$  — окрестность точки  $x$ , содержащаяся в  $D$ . Пусть  $w = w(g_1, \dots, g_m)$  — произвольное редуцированное слово от  $g_1, \dots, g_m$ . Так как  $U(x)$  содержится в пересечении внешностей всех  $S_i$  и  $S'_i$ , то  $w(U(x)) \cap U(x) = \emptyset$  и  $w(x) \neq x$ , следовательно,  $w$  представляет нетривиальный элемент в группе  $G$  и  $\Omega(G) \neq \emptyset$ .

Докажем, что  $\Lambda(G)$  гомеоморфно канторовскому дисконтинууму.

Замыкания внутренностей поверхностей  $S_i$  и  $S'_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, m$ , назовем множествами нулевого поколения. Если  $w = w(g_1, \dots, g_m)$  — редуцированное слово длины  $k$ , то  $\overline{\text{int}(w(S_i))}$  и  $\overline{\text{int}(w(S'_i))}$  будем называть множествами  $k$ -го поколения. Пусть  $U_k$  — объединение всех множеств  $k$ -го поколения. Заметим, что, если  $V_1$  и  $V_2$  — различные множества одного поколения, то либо  $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ , либо одно содержится в другом. Кроме того,  $U_{k+1} \subset U_k$  для всех  $k = 1, 2, 3, \dots$ . Таким образом, предельное множество  $\Lambda(G)$  лежит в пересечении всех  $U_k$ .

Группа  $G$  неэлементарная, поэтому ее предельное множество совершенно [1]. Таким образом, для доказательства того, что  $\Lambda(G)$  — дисконтинуум, достаточно показать, что оно нульмерно [6].

Предположим противное. Пусть  $\Lambda(G)$  содержит отрезок кривой, который обозначим через  $\gamma$ . Тогда для любого  $k$  существует множество  $k$ -го поколения, содержащее  $\gamma$ . Поскольку поверхностей  $S_i$  и  $S'_i$  конечное число, то среди таких множеств существует бесконечно много образов замыкания одной поверхности. Пусть  $S_i$  такая поверхность и  $h_1, h_2, h_3, \dots$  — последовательность элементов, для которых  $\gamma \subset \overline{\text{int}(h_k(S_i))}$ , при этом  $h_k$  имеет длину  $k$ .

С другой стороны, поскольку  $G$  сходящаяся, то существуют точки  $t_1, t_2 \in \Lambda(G)$  и подпоследовательность  $\{h_{k_j}\}$  такие, что  $h_{k_j}(x) \rightarrow t_2$  равномерно на компактах в  $\mathbf{S}^3 \setminus t_1$ . Противоречие; следовательно,  $\Lambda(G)$  нульмерно и совершенно и тем самым гомеоморфно канторовскому дисконтинууму.  $\square$

Из лемм 2 и 5 теперь с очевидностью следует справедливость теоремы 2.

ЗАМЕЧАНИЕ. Поверхности  $S_1, S'_1, S_2, S'_2, \dots, S_m, S'_m$  в лемме 5, вообще говоря, могут быть зацеплены между собой, а потому предельное множество группы  $G$  вполне может оказаться диким дисконтинуумом, т. е. таким, что не существует гомеоморфизма  $\mathbf{S}^3$  на себя, отображающего  $\Lambda(G)$  на отрезок. Примеры таких групп построены М. Фридманом и Р. Скорой [7].

## ЛИТЕРАТУРА

1. Gehring F. Martin G. Discrete quasiconformal groups. I // Proc. London Math. 1987. V. 55, N 3. P. 331–358.
2. Исаченко Н. А. О равномерно квазиконформных разрывных группах, не изоморфных мёбиусовым // Докл. АН СССР. 1990. Т. 313, № 5. С. 1040–1043.
3. Moise E. Affine structure on 3-manifolds // Ann. of Math. 1952. V. 56. P. 96–114.
4. Ху Сы-Цзян. Теория гомотопий. М.: Мир, 1964.
5. Гусевский Н. А. Группы Шоттки в пространстве // Докл. АН СССР. 1985. Т. 280, № 1. С. 30–33.
6. Александров П. С., Пасынков В. А. Введение в теорию размерности. М.: Наука, 1980.
7. Freedman M., Skora R. Strange actions of groups on spheres // J. Differential Geom. 1987. V. 25. P. 75–98.

*Статья поступила 30 января 2001 г.*

*Исаченко Николай Андреевич*

*Омский гос. университет, кафедра математического анализа,  
пр. Мира, 55а, Омск 644077*

*isachenk@univer.omsk.su; isachenko@math.omsu.omskreg.ru*