



S. Ya. Novikov, V. V. Sevost'yanova, Equivalence Classes of Parseval Frames, *Mat. Zametki*, 2022, Volume 112, Issue 6, 850–866

DOI: 10.4213/mzm13465

Use of the all-Russian mathematical portal Math-Net.Ru implies that you have read and agreed to these terms of use

<http://www.mathnet.ru/eng/agreement>

Download details:

IP: 18.97.9.172

March 27, 2025, 11:02:45





## Классы эквивалентности фреймов Парсевала

С. Я. Новиков, В. В. Севостьянова

В данной заметке вводится максимально широкая эквивалентность на множестве фреймов конечномерного пространства, которая сохраняет основные характеристики фрейма: жесткость, равноугольность, спарк (наименьшее количество линейно зависимых векторов), так называемую проективно-перестановочно унитарная эквивалентность. Выясняется, например, что в пространствах  $\mathbb{R}^3$ ,  $\mathbb{R}^5$  и  $\mathbb{R}^7$  жесткие равноугольные фреймы с полным спарком единственные с точностью до эквивалентности. Аналогичная единственность получена для общего равномерного фрейма Парсевала с  $d + 1$  векторами в пространстве  $\mathbb{R}^d$ . Такие вопросы неоднократно поднимались в литературе.

Вычисление спарка является гораздо более сложной задачей с вычислительной точки зрения, чем вычисление ранга матрицы. В данной заметке изложена методика, которая, возможно, облегчит вычисление спарка. Весьма полезным в эквивалентной классификации фреймов оказалось использование матриц Зейделя и техники дополнений по Наймарку.

Библиография: 10 названий.

**Ключевые слова:** жесткий фрейм, проективно-перестановочно унитарная эквивалентность, спарк, единственность, дополнение по Наймарку.

DOI: <https://doi.org/10.4213/mzm13465>

**1. Введение.** Фреймы конечномерных пространств становятся предметом активных исследований алгебраистов и аналитиков, а также специалистов по цифровой обработке сигналов [1]–[3]. Можно привести два эквивалентных определения фрейма. Пусть  $n$  и  $d$  – натуральные числа, причем  $n \geq d$ , и пусть  $\mathbb{F}$  обозначает поле  $\mathbb{R}$  или  $\mathbb{C}$ . *Конечный фрейм* в  $d$ -мерном гильбертовом пространстве  $\mathbb{H}^d$  над полем  $\mathbb{F}$  – это произвольный полный набор векторов:  $\text{span}\{\varphi_j\}_{j=1}^n = \mathbb{H}^d$ . Таким образом обобщается определение базиса, так как не требуется линейная независимость векторов.

Формальное определение фрейма выглядит так. Набор векторов  $\{\varphi_j\}_{j=1}^n$  называется *фреймом* для вещественного или комплексного  $\mathbb{H}^d$ , если существуют константы  $0 < a \leq b < \infty$  такие, что для всех  $\mathbf{x} \in \mathbb{H}^d$

$$a\|\mathbf{x}\|^2 \leq \sum_{j=1}^n |\langle \mathbf{x}, \varphi_j \rangle|^2 \leq b\|\mathbf{x}\|^2.$$

Эти два определения эквивалентны [4].

Работа выполнена в рамках реализации Программы развития Научно-образовательного математического центра Приволжского федерального округа (соглашение № 075-02-2022-878).

Каждый набор векторов и, в частности, фрейм, порождает несколько операторов.

Оператор *синтеза* для конечного набора векторов  $\{\varphi_j\}_{j=1}^n$  из  $\mathbb{H}^d$  определяется как

$$\Phi: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{H}^d, \quad \Phi \mathbf{x} := \sum_{j=1}^n \mathbf{x}(j) \varphi_j,$$

где  $\mathbf{x}(j)$  обозначает  $j$ -ю координату вектора  $\mathbf{x} \in \mathbb{F}^n$ . Сопряженным к оператору синтеза является оператор *анализа*  $\Phi^*: \mathbb{H}^d \rightarrow \mathbb{F}^n$ , для которого  $(\Phi^* \mathbf{y})(j) = \langle \varphi_j, \mathbf{y} \rangle$  для всех  $j = 1, \dots, n$ .

Все скалярные произведения в данной статье сопряженно-линейны по *первому* аргументу и линейны по второму, т.е.

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_j \overline{\mathbf{x}(j)} \mathbf{y}(j).$$

Композиция операторов анализа и синтеза определяет оператор Грама

$$\Phi^* \Phi: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$$

с соответствующей  $(n \times n)$ -матрицей, у которой  $(\Phi^* \Phi)(j, j') = \langle \varphi_j, \varphi_{j'} \rangle$ .

Перестановкой операторов получается *фреймовый оператор*

$$\Phi \Phi^*: \mathbb{H}^d \rightarrow \mathbb{H}^d, \quad \Phi \Phi^* \mathbf{y} = \sum_{j=1}^n \langle \varphi_j, \mathbf{y} \rangle \varphi_j.$$

Хорошо известно, что последовательности  $\{\varphi_j\}_{j=1}^n$  из  $\mathbb{H}^d$  и  $\{\widehat{\varphi}_j\}_{j=1}^n$  из  $\widehat{\mathbb{H}^d}$  имеют одинаковые матрицы Грама тогда и только тогда, когда существует унитарный оператор  $\mathbf{U}: \mathbb{H}^d \rightarrow \widehat{\mathbb{H}^d}$  такой, что  $\mathbf{U} \varphi_j = \widehat{\varphi}_j$  для всех  $j = 1, \dots, n$ .

Для отдельно взятого вектора  $\{\varphi_j\}$ ,  $j = 1, \dots, n$ , операторы синтеза и анализа определяются так:

$$\begin{aligned} \varphi_j: \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{H}^d, & \varphi_j x &= x \varphi_j, \\ \varphi_j^*: \mathbb{H}^d &\rightarrow \mathbb{F}, & \varphi_j^* \mathbf{y} &= \langle \varphi_j, \mathbf{y} \rangle. \end{aligned}$$

Используя эти определения, оператор синтеза можно записать в виде

$$\Phi \Phi^* = \sum_{j=1}^n \varphi_j \varphi_j^*.$$

Матрица оператора синтеза  $\Phi$  представляет собой  $(d \times n)$ -матрицу, столбцами которой являются векторы  $\{\varphi_j\}_{j=1}^n$  фрейма.

В частности, если фреймовые границы равны между собой ( $a = b$ ), то фреймовый оператор  $\Phi \Phi^* = a \mathbf{I}$ , и представление вектора  $\mathbf{x}$  становится особенно простым:

$$\mathbf{x} = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^d \langle \mathbf{x}, \varphi_i \rangle \varphi_i, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{H}^d.$$

Такие фреймы называются *жесткими* или *a-жесткими*. 1-Жесткие фреймы называют *фреймами Парсеваля* или *нормализованными жесткими фреймами*.

Фреймы, векторы которых имеют одинаковые нормы, называют *равномерными*: фрейм  $\{\varphi_j\}_{j=1}^n$  называется *равномерным*, если существует  $c > 0$  такое, что  $\|\varphi_j\|^2 = c$ ,  $j = 1, \dots, n$ .

Если фрейм  $a$ -жесткий и равномерный, то возникают связи между  $d = \dim(\mathbb{H})$ ,  $c$  и  $a$ :

$$da = \text{Tr}(a\mathbf{I}) = \text{Tr}(\Phi\Phi^*) = \text{Tr}(\Phi^*\Phi) = \sum_{j=1}^n \|\varphi_j\|^2 = nc.$$

Следовательно, для равномерного фрейма Парсевалья  $d = nc$ , поэтому нормы векторов такого фрейма не превосходят 1.

Первая явная конструкция равномерного жесткого фрейма с  $n$  векторами в  $\mathbb{R}^d$  для произвольных  $n \geq d$  появилась в работе Мальцева [5] (без использования таких терминов).

В настоящее время известно довольно много способов построения равномерных жестких фреймов для произвольной пары  $(d, n)$  с  $n \geq d$  как в вещественном, так и в комплексном пространствах [1].

Выделим еще один интересный класс фреймов среди множества равномерных фреймов.

Равномерный фрейм  $\{\varphi_j\}_{j=1}^n$  называется *равноугольным*, если существует  $w \geq 0$  такое, что

$$|\langle \varphi_j, \varphi_{j'} \rangle|^2 = w \quad \text{для всех } j \neq j'.$$

В данной заметке проводится классификация фреймов по классам их эквивалентностей. Показано, что в пространствах  $\mathbb{R}^5$  и  $\mathbb{R}^7$  фреймы с 10 и 14 векторами соответственно оказываются единственными с точностью до введенной проективно-перестановочной унитарной эквивалентности. Аналогичная единственность получена для общего равномерного фрейма Парсевалья с  $d + 1$  векторами в пространстве  $\mathbb{R}^d$ . Такие вопросы неоднократно поднимались в литературе [6], [2], [3].

Большое внимание в прикладных исследованиях привлекают фреймы с полным спарком; это фреймы  $\{\varphi_j\}_{j=1}^n$  в  $\mathbb{H}^d$  такие, что каждый набор из  $d$  векторов этого фрейма является линейно независимым [7]. Вычисление спарка, т.е. минимального количества линейно зависимых векторов системы, является вычислительно гораздо более сложной задачей, чем вычисление ранга матрицы. В данной заметке изложена методика, которая, возможно, облегчит вычисление спарка. Весьма полезным в эквивалентной классификации фреймов оказалось использование матриц Зейделя и техники дополнений по Наймарку.

**2. Матрицы Грама.** Пусть  $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$  – фрейм Парсевалья в своей линейной оболочке. Его фреймовый оператор  $\Phi\Phi^* = \mathbf{I}$ . Рассмотрим матрицу Грама этого фрейма.

**ТЕОРЕМА 1.** *Квадратная матрица  $\mathbf{G}$  порядка  $n$  является матрицей Грама для фрейма Парсевалья  $\{\varphi_j\}_{j=1}^n$  пространства  $\text{span}(\{\varphi_j\}_{j=1}^n)$  с размерностью, равной рангу матрицы  $\mathbf{G}$ , тогда и только тогда, когда  $\mathbf{G}$  является матрицей ортогонального проектирования, т.е.  $\mathbf{G} = \mathbf{G}^* = \mathbf{G}^2$ .*

При этом

$$d = \text{rank}(\mathbf{G}) = \text{Tr}(\mathbf{G}) = \sum_{i=1}^n \|\varphi_i\|^2.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. ( $\Rightarrow$ ) Представляя матрицу Грама в виде композиции операторов анализа и синтеза, имеем

$$\mathbf{G}^2 = (\Phi^* \Phi)(\Phi^* \Phi) = \Phi^*(\Phi \Phi^*)\Phi = \Phi^* \mathbf{I} \Phi = \mathbf{G}.$$

Самосопряженность  $\mathbf{G}$  очевидна.

( $\Leftarrow$ ) Пусть  $\mathbf{G}$  – квадратная матрица порядка  $n$  и  $\mathbf{G} = \mathbf{G}^* = \mathbf{G}^2$ . Столбцы матрицы  $\mathbf{G}$  обозначим через  $\varphi_i = \mathbf{G}e_i, i = 1, 2, \dots, n$ , где  $\{e_i\}_{i=1}^n$  – стандартный ортонормированный базис в  $\mathbb{H}^n$ . Если  $\mathbf{f} \in \text{span}(\{\varphi_j\}_{j=1}^n)$ , то  $\mathbf{f} = \mathbf{G}\mathbf{f}$  и

$$\mathbf{f} = \mathbf{G} \left( \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{G}\mathbf{f}, e_i \rangle e_i \right) = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{f}, \mathbf{G}e_i \rangle \mathbf{G}e_i = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{f}, \varphi_i \rangle \varphi_i,$$

т.е.  $\{\varphi_j\}_{j=1}^n$  является фреймом Парсеваля в  $\text{span}(\{\varphi_j\}_{j=1}^n)$ . Матрицей Грама этого фрейма оказывается матрица  $\mathbf{G}$ . Размерность пространства  $\text{span}(\{\varphi_j\}_{j=1}^n)$  определяется рангом матрицы  $\mathbf{G}$ .

Для матрицы ортогонального проектирования ранг совпадает с ее следом, что обосновывает последнее равенство в формулировке теоремы.

На множестве фреймов можно ввести различные классы эквивалентности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Два фрейма  $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$  и  $\{\psi_i\}_{i=1}^n$  называются *унитарно эквивалентными*, если существует унитарное преобразование  $\mathbf{U}$ , переводящее векторы одного фрейма в векторы другого:

$$\psi_i = \mathbf{U}\varphi_i \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Поскольку унитарное преобразование сохраняет скалярное произведение, матрицы Грама унитарно эквивалентных фреймов совпадают. Верно и обратное утверждение: если матрицы Грама двух систем векторов совпадают, то эти системы унитарно эквивалентны. Таким образом, в частности, фреймы Парсеваля унитарно эквивалентны тогда и только тогда, когда их матрицы Грама совпадают.

Заметим также, что класс фреймов Парсеваля инвариантен относительно унитарных преобразований. Действительно, фреймовый оператор  $\mathbf{S}_{\mathbf{U}\Phi}$  векторов  $\{\mathbf{U}\varphi_i\}_{i=1}^n$  равен

$$\mathbf{S}_{\mathbf{U}\Phi} = \mathbf{U}\Phi(\mathbf{U}\Phi)^* = \mathbf{U}\mathbf{I}\mathbf{U}^* = \mathbf{I}.$$

Справедливо и следующее

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. Пусть линейный оператор  $\mathbf{F}: \mathbb{H}^d \rightarrow \mathbb{H}^d$  обратим и образом каждого фрейма Парсеваля  $\{\varphi_i\}_i$  при этом отображении вновь является фрейм Парсеваля  $\{\mathbf{F}\varphi_i\}_i$ . Тогда  $\mathbf{F}$  – унитарное преобразование.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как фреймы  $\{\varphi_i\}_i$  и  $\{\mathbf{F}\varphi_i\}_i$  – фреймы Парсеваля, то их фреймовые операторы  $\mathbf{S}_{\mathbf{F}\Phi} = \mathbf{S}_{\Phi} = \mathbf{I}$ . Как было отмечено,  $\mathbf{S}_{\mathbf{F}\Phi} = \mathbf{F}\mathbf{S}_{\Phi}\mathbf{F}^*$ . Следовательно,  $\mathbf{I} = \mathbf{F}\mathbf{I}\mathbf{F}^* = \mathbf{F}\mathbf{F}^*$ , т.е. оператор  $\mathbf{F}$  является биекцией и  $\mathbf{F}\mathbf{F}^* = \mathbf{I}$ .

Класс унитарно эквивалентных фреймов определяется порядком, в котором расположены векторы фрейма. Например, фреймы Парсеваля с матрицами синтеза

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

не являются унитарно эквивалентными – достаточно сравнить их матрицы Грама.

**3. Эквивалентные фреймы.** Обозначим через  $S_n$  группу перестановок длины  $n$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.** Будем говорить, что два фрейма Парсевалья  $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$  и  $\{\psi_i\}_{i=1}^n$  унитарно эквивалентны с точностью до перестановки или перестановочно унитарно эквивалентны, если существует перестановка  $\sigma \in S_n$ , для которой фреймы  $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$  и  $\{\psi_{\sigma(i)}\}_{i=1}^n$  унитарно эквивалентны.

Заметим вновь, что класс всех фреймов Парсевалья инвариантен и относительно перестановочно унитарной эквивалентности. Если перестановка  $\sigma$  меняет местами векторы  $\varphi_i$  и  $\varphi_j$  фрейма  $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$  с матрицей Грама  $\mathbf{G}$ , то в новой матрице Грама  $\mathbf{G}'$  поменяются местами строки и столбцы с номерами  $i$  и  $j$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.** Фреймы Парсевалья  $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$  и  $\{\psi_i\}_{i=1}^n$  называются проективно унитарно эквивалентными, если существует унитарное преобразование  $\mathbf{U}$  и числа  $\alpha_i$ ,  $|\alpha_i| = 1$ , для которых выполняется

$$\psi_i = \alpha_i \mathbf{U} \varphi_i \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Умножение вектора  $\varphi_i$  на число  $\alpha_i$  меняет матрицу Грама  $\mathbf{G}$  фрейма следующим образом:  $i$ -я строка в  $g$  умножается на  $\overline{\alpha_i}$ , а  $i$ -й столбец – на  $\alpha_i$ .

Заметим, что из проективной унитарной эквивалентности не следует унитарная эквивалентность. Действительно, легко проверить, что следующие два проективно унитарно эквивалентных фрейма с матрицами синтеза

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

не являются унитарно эквивалентными.

Точная характеристика проективно унитарной эквивалентности фреймов с  $n$  векторами дается с помощью анализа циклов в некотором построенном по фрейму графе с  $n$  вершинами [8].

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.** Будем говорить, что два фрейма  $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$  и  $\{\psi_i\}_{i=1}^n$  проективно-перестановочно унитарно эквивалентны, если существует перестановка  $\sigma \in S_n$ , для которой фреймы  $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$  и  $\{\psi_{\sigma(i)}\}_{i=1}^n$  проективно унитарно эквивалентны.

И еще раз отмечаем инвариантность класса фреймов Парсевалья относительно только что определенной эквивалентности. Из сказанного выше следует

**ТЕОРЕМА 2.** Фреймы Парсевалья являются проективно-перестановочно унитарно эквивалентными тогда и только тогда, когда их матрицы Грама могут быть получены друг из друга цепочкой элементарных преобразований следующего вида:

- для каждого  $i = 1, 2, \dots, n$  умножение  $i$ -й строки на число  $\overline{\alpha_i}$  и умножение  $i$ -го столбца на число  $\alpha_i$  для некоторого  $\alpha_i$  такого, что  $|\alpha_i| = 1$ ;
- одновременная замена местами строк и столбцов с номерами  $i$  и  $j$  для каждой фиксированной пары индексов  $(i, j)$ .

Другими словами, фреймы  $\Phi = \{\varphi_i\}_{i=1}^n$  и  $\Psi = \{\psi_i\}_{i=1}^n$  проективно-перестановочно унитарно эквивалентны тогда и только тогда, когда их матрицы Грама связаны соотношением

$$\text{gram}(\Psi) = \mathbf{C}^* \text{gram}(\Phi) \mathbf{C},$$

где  $\mathbf{C}$  – матрица, в каждой строке и каждом столбце которой стоит единственное ненулевое число, модуль которого равен 1.

Как было показано в доказательстве теоремы 1, каждый фрейм Парсевалья определяется (с точностью до унитарной эквивалентности) матрицей Грама  $\mathbf{G}$ , которая для фрейма Парсевалья оказывается матрицей ортогонального проектирования в пространстве  $\mathbb{F}^n$ , столбцы матрицы  $\mathbf{G}$  и являются (с точностью до унитарной эквивалентности) векторами фрейма Парсевалья в своей линейной оболочке, размерность которой равна рангу матрицы  $\mathbf{G}$ .

Покажем теперь, что полученные ранее в [2] равноугольные жесткие фреймы пространства  $\mathbb{R}^5$  с 10 векторами и пространства  $\mathbb{R}^7$  с 14 векторами оказываются единственными с точностью до проективно-перестановочно унитарной эквивалентности.

Интерес к этим фреймам возник в связи с полученным в [2] (см. также [3]) результатом, согласно которому равноугольные жесткие фреймы пространства  $\mathbb{R}^d$  с полным спарком могут иметь только  $2d$  векторов.

Напомним, что *спарком* фрейма  $\Phi$  называется минимальное количество линейно зависимых векторов  $\Phi$ . Если спарк  $\Phi$  максимально возможный, на единицу больше размерности  $\text{span}(\Phi)$ , то говорят о фрейме с *полным спарком* [2]. Фреймы с полным спарком являются удобными словарями в задачах сжатых измерений и для разреженных и избыточных представлений [7].

Близкое следующей теореме утверждение приводится без доказательства в [9].

**ТЕОРЕМА 3.** *Равноугольный фрейм Парсевалья пространства  $\mathbb{R}^d$  с  $2d$  векторами возможен только для нечетного  $d$ .*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$  – равноугольный фрейм Парсевалья пространства  $\mathbb{R}^d$ . Для фрейма Парсевалья имеет место равенство  $1 = cn/d$ , где  $c = \|\varphi_i\|^2$ . (Напомним, что равноугольный фрейм, по определению, равномерный, т.е. нормы всех его векторов равны друг другу.) Пусть также  $n = 2d$ , тогда  $\|\varphi_i\|^2 = 1/2$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Для равноугольного фрейма имеем

$$|\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle|^2 = c^2 \frac{n-d}{d(n-1)}, \quad |\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle| = \frac{1}{2\sqrt{2d-1}}, \quad i \neq j.$$

Матрица Грама такого фрейма имеет вид

$$\mathbf{G} = \frac{1}{2\sqrt{2d-1}} \begin{pmatrix} \sqrt{2d-1} & \delta_{1,2} & \dots & \delta_{1,n} \\ \delta_{1,2} & \sqrt{2d-1} & \dots & \delta_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{1,n} & \delta_{2,n} & \dots & \sqrt{2d-1} \end{pmatrix}, \quad \delta_{i,j} = \pm 1. \quad (3.1)$$

Как показано в теореме 1, фрейм  $\{\varphi_i\}_{i=1}^n$  унитарно эквивалентен столбцам матрицы Грама  $\mathbf{G}$ .

Умножив некоторые векторы фрейма на  $-1$  и перейдя таким образом к проективно унитарно эквивалентному фрейму, можно получить, что в матрице Грама в первой строке и первом столбце стоят единицы:  $\delta_{1,j} = 1$ ,  $j = 2, \dots, n$ , и  $\delta_{j,1} = 1$ ,  $j = 2, \dots, n$ .

В силу теоремы 1 имеет место равенство  $\mathbf{G}^2 = \mathbf{G}$ . Поскольку матрица  $\mathbf{G}$  симметрична, скалярное произведение первой и  $i$ -й строк матрицы Грама равно

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2\sqrt{2d-1}}\right)^2 \left(2\delta_{1,i}\sqrt{2d-1} + \sum_{j \neq 1,i} \delta_{1,j}\delta_{i,j}\right) &= \frac{1}{2\sqrt{2d-1}}\delta_{1,i}, \\ \left(\frac{1}{2\sqrt{2d-1}}\right)^2 \left(2\sqrt{2d-1} + \sum_{j \neq 1,i} \delta_{i,j}\right) &= \frac{1}{2\sqrt{2d-1}}, \\ \sum_{j \neq 1,i} \delta_{i,j} &= 0. \end{aligned} \tag{3.2}$$

Последнее означает, что в каждой строке  $i$ ,  $i \neq 1$ , матрицы Грама  $\mathbf{G}$  чисел  $\delta_{i,j} = 1$  на одну больше, чем чисел  $\delta_{i,j} = -1$ . Аналогично, скалярное произведение строк матрицы (3.1) с номерами  $i$  и  $j$ ,  $1 < i < j$ , равно

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2\sqrt{2d-1}}\right)^2 \left(1 + 2\delta_{i,j}\sqrt{2d-1} + \sum_{k \neq i,j} \delta_{i,k}\delta_{j,k}\right) &= \frac{1}{2\sqrt{2d-1}}\delta_{i,j}, \\ \sum_{k \neq i,j} \delta_{i,k}\delta_{j,k} &= -1. \end{aligned} \tag{3.3}$$

Таким образом, если провести преобразование

$$2\sqrt{2d-1}(\mathbf{G} - \sqrt{2d-1} \cdot \mathbf{I})$$

и удалить из получившейся таким образом матрицы первую строку и первый столбец, то получится симметрическая  $((n-1) \times (n-1))$ -матрица  $\mathbf{T}$  с нулями на главной диагонали и числами  $\pm 1$  вне нее, так, что в каждой строке (столбце) 1 и  $-1$  поровну, а скалярное произведение любых двух строк равно  $-1$ .

Матрицы такого вида хорошо известны в теории графов, они являются матрицами смежности и называются *матрицами Зейделя* [10].

Предположим, что  $d$  – четное число. Поскольку фреймы рассматриваются с точностью до перестановки векторов, можно считать, что векторы фрейма упорядочены таким образом, что первая строка матрицы Зейделя  $\mathbf{T}$ , соответствующая второй строке матрицы Грама, имеет вид

$$\underbrace{\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 0 & +1 & +1 & \dots & +1 & -1 & -1 & \dots & -1 \\ \hline \end{array}}_d \underbrace{\hspace{10em}}_{d-1}$$

Рассмотрим вторую строку матрицы  $\mathbf{T}$ . Аналогично, учитывая, что  $+1$  и  $-1$  представлены в равном количестве, переставим столбцы  $2, 3, \dots, d$  и  $d+1, d+2, \dots, 2d$  матрицы Грама так, чтобы вторая строка матрицы  $\mathbf{T}$  имела вид

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 0 & +1 & +1 & \dots & +1 & +1 & \dots & +1 & -1 & \dots & -1 & -1 & \dots & -1 \\ +1 & 0 & +1 & \dots & +1 & -1 & \dots & -1 & +1 & \dots & +1 & -1 & \dots & -1 \\ \hline \end{array}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{d-2} \underbrace{\hspace{10em}}_{d-1}$$

где  $a$  – количество  $+1$  в первой группе, стоящей правее главной диагонали на второй строке,  $0 \leq a \leq d-2$ .



Скалярное произведение этих строк равно  $-1 = 4a - 2d + 3$ , и число  $a = (d - 3)/2$  целое только при нечетном  $d$ . Таким образом, равноугольный фрейм Парсеваля с  $n = 2d$  возможен только при нечетных  $d$ .

**ЗАМЕЧАНИЕ 1.** В  $\mathbb{R}^3$  равноугольный фрейм Парсеваля с полным спарком хорошо известен [3]. Ниже в данной заметке будет проведена подробная классификация таких фреймов с точностью до эквивалентности в пространствах  $\mathbb{R}^5$  и  $\mathbb{R}^7$ . Аналогичные рассуждения и результаты справедливы и в  $\mathbb{R}^3$ , оставляем их заинтересованному читателю.

**ТЕОРЕМА 4.** В  $\mathbb{R}^5$  существует единственный с точностью до проективно-перестановочно унитарной эквивалентности равноугольный фрейм Парсеваля с 10 векторами.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Построим матрицу Зейделя  $\mathbf{T}$  размера  $9 \times 9$ . Пусть первые две строки  $T$  имеют такой же вид, как в вычислениях выше; здесь  $a = 1$ :

0	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1
+1	0	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1

Проверяя условие (3.3) для  $i = 1, 2$  и  $j = 3$ , получим, что третья строка матрицы  $T$  может иметь единственный возможный вид. Более того, непосредственные вычисления показывают, что в этом случае матрица Зейделя с фиксированными первыми двумя строками будет следующей:

0	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1
+1	0	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1
+1	+1	0	-1	-1	-1	-1	+1	+1
+1	-1	-1	0	+1	+1	-1	+1	-1
+1	-1	-1	+1	0	-1	+1	-1	+1
-1	+1	-1	+1	-1	0	+1	+1	-1
-1	+1	-1	-1	+1	+1	0	-1	+1
-1	-1	+1	+1	-1	+1	-1	0	+1
-1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	+1	0

Соответствующая матрица Грама имеет вид

$$\mathbf{G} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 3 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 3 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 3 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, матрица Грама  $\mathbf{G}$  равноугольного фрейма Парсеваля из 10 векторов в  $\mathbb{R}^5$  определена однозначно с точностью до проективно-перестановочно унитарной

эквивалентности. Это означает в силу теоремы 3 единственность соответствующего класса эквивалентности фреймов.

В работе [2] приводится пример равноугольного жесткого фрейма в случае (5, 10) с матрицей оператора синтеза

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Доказано, что 10 векторов этого фрейма лежат в 5-мерном векторном пространстве [2], [3].

Найдем их представление в  $\mathbb{R}^5$ . Заметим, что все 10 векторов ортогональны вектору  $\mathbf{e} = (1, 1, 1, 1, 1)$  и, следовательно, лежат в гиперплоскости  $\alpha$  в  $\mathbb{R}^6$ , ортогональной  $\mathbf{e}$ . Найдем ортогональный оператор  $\mathbf{A}_\varphi$ , переводящий вектор  $\mathbf{e}$  в вектор  $\mathbf{e}' = (0, 0, 0, 0, \sqrt{6})$ . Для этого последовательно осуществим цепочку поворотов в 2-мерных плоскостях с помощью операторов с матрицами

$$\mathbf{B}_i = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & \frac{1}{\sqrt{i}} & -\sqrt{\frac{i-1}{i}} & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \sqrt{\frac{i-1}{i}} & \frac{1}{\sqrt{i}} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, \quad i = 1, \dots, 5,$$

где нетривиальный блок  $2 \times 2$ , отвечающий повороту, стоит на пересечении строк и столбцов с номерами  $i-1, i$ . Искомый оператор  $\mathbf{A}_\varphi$  определяется матрицей

$$\mathbf{A}_\varphi = \mathbf{B}_5 \mathbf{B}_4 \mathbf{B}_3 \mathbf{B}_2 \mathbf{B}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\sqrt{\frac{2}{3}} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{5}} & \frac{1}{2\sqrt{5}} & \frac{1}{2\sqrt{5}} & \frac{1}{2\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & -\sqrt{\frac{5}{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

он переводит фрейм  $\Phi$  в его представление в  $\mathbb{R}^5$ . Явный вид матрицы синтеза  $\Phi' = A_\varphi \Phi$  без последней координаты имеет вид

$$\Phi' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & 2\sqrt{\frac{2}{3}} & 2\sqrt{\frac{2}{3}} & 2\sqrt{\frac{2}{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}} & \sqrt{\frac{2}{3}} & \sqrt{\frac{2}{3}} & \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \sqrt{3} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{3}{\sqrt{5}} & \frac{3}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{3}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{3}{\sqrt{5}} \\ \sqrt{\frac{6}{5}} & \sqrt{\frac{6}{5}} & \sqrt{\frac{6}{5}} & -\sqrt{\frac{6}{5}} & \sqrt{\frac{6}{5}} & \sqrt{\frac{6}{5}} & -\sqrt{\frac{6}{5}} & \sqrt{\frac{6}{5}} & -\sqrt{\frac{6}{5}} & -\sqrt{\frac{6}{5}} \end{pmatrix}.$$

Запишем матрицу Грама:

$$G' = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 3 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Матрицы Грама  $G$  и  $G'$  связаны следующей цепочкой элементарных преобразований:

- 1) умножить строки и столбцы с номерами 8, 9, 10 на  $-1$ ;
- 2) последовательно менять местами строки и столбцы с номерами 6 и 10, 7 и 9, 8 и 10, 7 и 8.

**ЗАМЕЧАНИЕ 2.** В работах [2], [3] вычислен спарк этого фрейма, он равен 4. Из полученных здесь результатов следует, что в пространстве  $\mathbb{R}^5$  не существует равноугольного жесткого фрейма с полным спарком.

Аналогичные рассуждения можно провести для равноугольных фреймов Парсевалья в  $\mathbb{R}^7$ , но, как будет показано, в этом пространстве равноугольный фрейм Парсевалья с полным спарком существует.

**ТЕОРЕМА 5.** *В  $\mathbb{R}^7$  существует единственный с точностью до проективно-перестановочно унитарной эквивалентности равноугольный фрейм Парсевалья с 14 векторами.*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Как было показано выше, для построения равномерного равноугольного фрейма Парсевалья достаточно найти соответствующую  $(13 \times 13)$ -матрицу Зейделя. Найдем параметр  $a = (d-3)/2 = 2$ . Повторяя рассуждения предыдущей теоремы, можно считать, что первые две строки матрицы Зейделя имеют вид

0	+1	+1	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
+1	0	+1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	-1	-1

Заполним остальные строки. Предположим, что на пересечении 3-й строки и 4-го столбца матрицы Зейделя стоит +1, тогда из симметричности матрицы Зейделя и условий (3.2) и (3.3) находится единственное возможное заполнение третьей строки:

+1	+1	0	+1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	+1
----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

При этом не существует заполнения оставшихся клеток 4-й строки такого, что выполняются условия (3.2) и (3.3) для всех четырех строк.

Пусть на пересечении 3-й строки и 4-го столбца стоит -1. Непосредственные вычисления показывают, что в этом случае с точностью до перестановок в наборах столбцов с номерами (5, 6, 7), а также (8, 9, 10) и (11, 12, 13), третья строка матрицы Зейделя имеет также единственный возможный вид (см. таблицу ниже). Аналогично, строка 4 также определяется однозначно с точностью до перестановок в парах столбцов для наборов (6, 7), (9, 10), (11, 12).

Продолжая вычисления, получаем, что остальные строки матрицы Зейделя заполняются однозначно:

0	+1	+1	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
+1	0	+1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	-1	-1
+1	+1	0	-1	+1	-1	-1	+1	-1	-1	+1	+1	-1
+1	+1	-1	0	-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	-1	+1
+1	-1	+1	-1	0	-1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
+1	-1	-1	+1	-1	0	+1	+1	-1	-1	-1	+1	+1
+1	-1	-1	-1	+1	+1	0	-1	+1	+1	-1	+1	-1
-1	+1	+1	-1	-1	+1	-1	0	-1	+1	-1	+1	+1
-1	+1	-1	+1	-1	-1	+1	-1	0	+1	+1	+1	-1
-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	+1	+1	0	-1	-1	+1
-1	-1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	+1	-1	0	+1	+1
-1	-1	+1	-1	-1	+1	+1	+1	+1	-1	+1	0	-1
-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	+1	-1	+1	+1	-1	0

Таким образом, матрица Грама **G** с найденной матрицей Зейделя является единственной с точностью до эквивалентности. Из теоремы 3 следует, что в случае (7, 14) существует единственный проективно унитарно эквивалентный с точностью до перестановки векторов равномерный равноугольный фрейм Парсеваля.

**ЗАМЕЧАНИЕ 3.** Как было отмечено ранее, любой равноугольный фрейм Парсеваля в  $\mathbb{R}^5$  с 10 векторами не будет фреймом с полным спарком. Для того, чтобы дать ответ на вопрос о наличии полного спарка в равноугольном фрейме Парсеваля с 14 векторами в  $\mathbb{R}^7$ , рассмотрим ассоциированное с фреймом векторное пространство линейных зависимостей векторов фрейма.

Ниже будет найден критерий, согласно которому можно проверить, является или нет данный фрейм фреймом с полным спарком. Итак, пусть  $\Phi = \{\varphi_i\}_{i=1}^n$  – фрейм

Парсеваля в  $\mathbb{F}^d$ , не обязательно равноугольный. Рассмотрим линейное пространство

$$\mathbb{V} = \{(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) \in \mathbb{F}^n : \gamma_1\varphi_1 + \gamma_2\varphi_2 + \dots + \gamma_n\varphi_n = 0\}.$$

Наша цель – описать пространство  $\mathbb{V}$ . Фиксируем некоторый ортонормированный базис в  $\mathbb{F}^d$ . Запишем в этом базисе матрицу оператора синтеза  $\Phi$ , столбцы которой являются векторами фрейма:

$$\Phi = (\varphi_1 \mid \varphi_2 \mid \dots \mid \varphi_n).$$

Множество решений системы  $d$  линейных однородных уравнений

$$\Phi \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \tag{3.4}$$

с  $n$  переменными  $\gamma_i$  совпадает с линейным пространством  $\mathbb{V}$ .

Поскольку  $\text{rank}(\Phi) = d$ , существуют  $d$  линейно независимых векторов  $\varphi_i$ . Рассматривая фрейм с точностью до перестановки векторов, можно считать, что линейно независимы последние  $d$  векторов фрейма, т.е. следующая квадратная матрица является невырожденной:

$$\mathbf{A}_2 = (\varphi_{n-d+1} \mid \varphi_{n-d+2} \mid \dots \mid \varphi_n). \tag{3.5}$$

Обозначим

$$\mathbf{A}_1 = (\varphi_1 \mid \varphi_2 \mid \dots \mid \varphi_{n-d}), \tag{3.6}$$

тогда  $\Phi = (\mathbf{A}_1 \mid \mathbf{A}_2)$ .

Элементарными преобразованиями со строками можно привести квадратную матрицу  $\mathbf{A}_2$  к единичной. Применим те же элементарные преобразования к  $\Phi$ , матрица  $\mathbf{A}_1$  в результате этих преобразований трансформируется в матрицу  $(d \times (n - d))$ -матрицу  $\mathbf{A} = (a_{i,j})$ , а матрица  $\Phi$  – в  $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$ . При этом существует некоторая невырожденная  $(d \times d)$ -матрица  $\mathbf{L}$ , для которой  $\Phi = \mathbf{L} \cdot (\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$ . Тогда  $(\mathbf{A}_1 \mid \mathbf{A}_2) = (\mathbf{L}\mathbf{A} \mid \mathbf{L})$ , откуда  $\mathbf{A} = \mathbf{A}_2^{-1}\mathbf{A}_1$ .

Система (3.4) эквивалентна системе

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{I}) \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \dots \\ \gamma_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

В качестве базиса пространства решений, а значит, и базиса  $\mathbb{V}$  можно взять следующий набор векторов:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 &= (1, 0, \dots, 0, -a_{1,1}, -a_{2,1}, \dots, -a_{d,1}), \\ \mathbf{e}_2 &= (0, 1, \dots, 0, -a_{1,2}, -a_{2,2}, \dots, -a_{d,2}), \\ &\dots \\ \mathbf{e}_{n-d} &= (0, 0, \dots, 1, -a_{1,n-d}, -a_{2,n-d}, \dots, -a_{d,n-d}). \end{aligned}$$

Напомним, что фрейм  $\Phi$  в  $\mathbb{H}^d$  является фреймом с полным спарком, если любые  $d$  векторов фрейма линейно независимы.

**ЛЕММА 1.** Пусть матрица оператора синтеза фрейма Парсеваля  $\Phi$  элементарными преобразованиями строк приведена к виду  $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$ , как описано выше. Тогда фрейм  $\Phi$  является фреймом с полным спарком тогда и только тогда, когда любой минор матрицы  $\mathbf{A}$  отличен от нуля.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть дан фрейм с полным спарком, и пусть  $M$  – некоторый минор матрицы  $\mathbf{A}$  произвольного порядка  $k$ ,  $1 \leq k \leq d$ . Без ограничения общности можно считать, что матрица, определяющая  $M$ , лежит в левом верхнем углу  $\mathbf{A}$ :

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k,1} & \dots & a_{k,k} \end{vmatrix}. \quad (3.7)$$

Покажем, что  $M \neq 0$ . Действительно, наличие полного спарка означает, что любые  $d$  столбцов матрицы оператора синтеза линейно независимы. Поскольку элементарные преобразования строк не влияют на линейную независимость столбцов, в матрице  $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$  любые  $d$  столбцов линейно независимы. В частности, линейно независимы столбцы с номерами  $1, 2, \dots, k, n-d+k+1, n-d+k+2, \dots, n$ . Выпишем их:

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} a_{1,1} & \dots & a_{1,k} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k,1} & \dots & a_{k,k} & 0 & \dots & 0 \\ \hline a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,k} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{d,1} & \dots & a_{d,k} & 0 & \dots & 1 \end{array} \right), \quad (3.8)$$

отсюда немедленно получаем  $M \neq 0$ .

Проведенные рассуждения можно выполнить в обратном порядке и, тем самым, завершить доказательство.

Для рассмотренного выше случая равноугольного фрейма Парсеваля с 14 векторами в  $\mathbb{R}^7$  была найдена матрица  $\mathbf{A}$  с помощью системы компьютерной математики Mathematica, а также вычислены все миноры  $\mathbf{A}$ . Оказалось, что все миноры отличны от нуля, следовательно, в силу доказанной выше эквивалентности в  $\mathbb{R}^7$  все равноугольные фреймы Парсеваля, содержащие 14 векторов, унитарно перестановочно проективно эквивалентны и являются фреймами с полным спарком.

#### 4. Дополнения по Наймарку.

**ТЕОРЕМА 6 [3].** Для любого фрейма Парсеваля  $\Phi = \{\varphi_i\}_{i=1}^n$  в  $d$ -мерном пространстве  $\text{span}(\Phi)$  существует дополнение по Наймарку, т.е. фрейм Парсеваля  $\Psi = \{\psi_i\}_{i=1}^n$  в  $(n-d)$ -мерном пространстве  $\text{span}(\Psi)$ , для которого выполняются следующие свойства:

- если  $\Psi$  – оператор синтеза фрейма  $\{\psi_i\}_{i=1}^n$ , то  $\Psi^* \Psi = \mathbf{I}_{\mathbb{R}^n} - \Phi^* \Phi$ ;
- $\Phi \Psi^* = \mathbf{0}$ .

Следствием этой теоремы является утвердительный ответ на вопрос из [6]: является ли любой равномерный фрейм Парсеваля  $\{\varphi_i\}_{i=1}^{d+1}$  в  $\mathbb{R}^d$  единственным с точностью до перестановочно-проективной унитарной эквивалентности?

Если  $\{\varphi_i\}_{i=1}^{d+1}$  – равномерный фрейм Парсеваля в  $\mathbb{R}^d$ , то его дополнение по Наймарку представляет собой набор вещественных чисел  $\{\psi_i\}_{i=1}^{d+1}$  с одинаковыми модулями  $|\psi_i| = 1/\sqrt{d+1}$ ,  $i = 1, \dots, d+1$ . Эти числа однозначно определяют матрицу Грама фрейма  $\{\varphi_i\}_{i=1}^{d+1}$ , который оказывается равноугольным и единственным с точностью до перестановочно-проективной унитарной эквивалентности.

Пусть  $\Psi$  – дополнение по Наймарку к рассматриваемому выше фрейму  $\Phi$ . Рассмотрим ассоциированное с фреймом  $\Psi$  векторное пространство линейных зависимостей векторов фрейма:

$$\mathbb{W} = \{(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n) \in \mathbb{F}^n : \delta_1\psi_1 + \delta_2\psi_2 + \dots + \delta_n\psi_n = 0\}.$$

Рассмотрим, как связаны пространства  $\mathbb{V}$  и  $\mathbb{W}$ .

Проведем аналогичные рассуждения для фрейма  $\Psi$ . Обозначим

$$\mathbf{B}_1 = (\psi_1 \mid \psi_2 \mid \dots \mid \psi_{n-d}), \quad \mathbf{B}_2 = (\psi_{n-d+1} \mid \psi_{n-d+2} \mid \dots \mid \psi_n), \\ \Psi = (\mathbf{B}_1 \mid \mathbf{B}_2).$$

Согласно сделанным выше предположениям матрица  $\mathbf{A}_2$  из представления  $\Phi = (\mathbf{A}_1 \mid \mathbf{A}_2)$  является невырожденной. Покажем, что и матрица  $\mathbf{B}_1$  для дополнения по Наймарку тоже невырожденная.

Поскольку рассматриваются фреймы Парсеваля, в силу свойства б) теоремы 6 получаем, что матрица

$$\mathbf{S} := \left( \begin{array}{c} \Phi \\ \Psi \end{array} \right)$$

является самосопряженной; действительно,

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{S}^* = \left( \begin{array}{c} \Phi \\ \Psi \end{array} \right) \cdot (\Phi^* \mid \Psi^*) = \left( \begin{array}{c|c} \Phi\Phi^* & \Phi\Psi^* \\ \hline \Phi\Psi^* & \Psi\Psi^* \end{array} \right) = \mathbf{I}_{\mathbb{F}^n}, \\ \mathbf{S} = \left( \begin{array}{c} \Phi \\ \Psi \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c|c} \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 \\ \hline \mathbf{B}_1 & \mathbf{B}_2 \end{array} \right), \\ \mathbf{I}_{\mathbb{F}^n} = \mathbf{S} \cdot \mathbf{S}^* = \left( \begin{array}{c|c} \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 \\ \hline \mathbf{B}_1 & \mathbf{B}_2 \end{array} \right) \left( \begin{array}{c|c} \mathbf{A}_1^* & \mathbf{B}_1^* \\ \hline \mathbf{A}_2^* & \mathbf{B}_2^* \end{array} \right) \\ = \left( \begin{array}{c|c} \mathbf{A}_1\mathbf{A}_1^* + \mathbf{A}_2\mathbf{A}_2^* & \mathbf{A}_1\mathbf{B}_1^* + \mathbf{A}_2\mathbf{B}_2^* \\ \hline \mathbf{B}_1\mathbf{A}_1^* + \mathbf{B}_2\mathbf{A}_2^* & \mathbf{B}_1\mathbf{B}_1^* + \mathbf{B}_2\mathbf{B}_2^* \end{array} \right),$$

отсюда

$$\mathbf{A}_1\mathbf{B}_1^* + \mathbf{A}_2\mathbf{B}_2^* = \mathbf{0}, \quad \mathbf{B}_1\mathbf{B}_1^* + \mathbf{B}_2\mathbf{B}_2^* = \mathbf{I}_{\mathbb{F}^{n-d}}.$$

Из первого равенства получаем

$$\mathbf{B}_2^* = -\mathbf{A}_2^{-1}\mathbf{A}_1\mathbf{B}_1^* = -\mathbf{A}\mathbf{B}_1^*,$$

откуда имеем

$$\mathbf{B}_2\mathbf{B}_2^* = \mathbf{B}_1\mathbf{A}^*\mathbf{A}\mathbf{B}_1^*$$

и подставляем во второе

$$\mathbf{I}_{\mathbb{F}^{n-d}} = \mathbf{B}_1\mathbf{B}_1^* + \mathbf{B}_1\mathbf{A}^*\mathbf{A}\mathbf{B}_1^* = \mathbf{B}_1(\mathbf{I}_{\mathbb{F}^{n-d}} + \mathbf{A}^*\mathbf{A})\mathbf{B}_1^*.$$





ортогональны и  $\mathbb{V} \oplus \mathbb{W} = \mathbb{F}^n$ . Более того, их базисами являются столбцы соответствующих матриц:

$$\left( \begin{array}{c} \mathbf{I}_{\mathbb{R}^{n-d}} \\ -\mathbf{A} \end{array} \right), \quad \left( \begin{array}{c} \mathbf{A}^* \\ \mathbf{I}_{\mathbb{R}^d} \end{array} \right),$$

где  $\mathbf{A} = -\mathbf{A}_2^{-1}\mathbf{A}_1$  для матриц из (3.5) и (3.6).

Приведенное ниже следствие ранее было доказано другим методом в [3].

**СЛЕДСТВИЕ 1.** *Фрейм Парсеваля  $\Phi$  является фреймом с полным спарком тогда и только тогда, когда его дополнение по Наймарку  $\Psi$  – фрейм Парсеваля с полным спарком.*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** По лемме 1 фрейм  $\Phi$  является фреймом с полным спарком тогда и только тогда, когда любой минор матрицы  $\mathbf{A}$  отличен от нуля. Но это означает, что и любой минор матрицы  $\mathbf{B} = -\mathbf{A}^*$  отличен от нуля. Последнее эквивалентно тому, что фрейм  $\Psi$  имеет полный спарк.

Следующее утверждение показывает связь между линейными зависимостями фрейма и его дополнения по Наймарку.

**СЛЕДСТВИЕ 2.** *Векторы фрейма  $\Phi$  с номерами  $i_1, i_2, \dots, i_d$  ( $d$  штук) линейно зависимы тогда и только тогда, когда в дополнении по Наймарку  $\Psi$  линейно зависимы  $n - d$  векторов с номерами из множества  $\{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_d\}$ .*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Предположим, что в  $\Phi$ , как и ранее, последние  $d$  векторов линейно независимы, тогда  $\Phi \sim (\mathbf{A} \mid \mathbf{I}_{\mathbb{R}^d})$  и  $\Psi \sim (\mathbf{I}_{\mathbb{R}^{n-d}} \mid \mathbf{B})$ .

Пусть в  $\Phi$  некоторые  $d$  векторов линейно зависимы. Без ограничения общности можно считать, что взяты первые  $k$  и последние  $d - k$  векторов фрейма для некоторого  $k$ ,  $0 < k \leq d$ . Тогда первые  $k$  столбцов матрицы  $\mathbf{A}$  и последние  $d - k$  столбцов матрицы  $\mathbf{I}_{\mathbb{R}^d}$  линейно зависимы, а значит, минор матрицы (3.8) равен нулю. Следовательно, минор (3.7) матрицы  $\mathbf{A}$  равен нулю. Тогда соответствующий минор матрицы  $\mathbf{B} = -\mathbf{A}^*$  также равен нулю:

$$M' = \begin{vmatrix} b_{1,1} & \dots & b_{1,k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k,1} & \dots & b_{k,k} \end{vmatrix} = 0,$$

откуда получаем, что

$$\left| \begin{array}{ccc|ccc} 0 & \dots & 0 & b_{1,1} & \dots & b_{1,k} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & b_{k,1} & \dots & b_{k,k} \\ \hline 1 & \dots & 0 & b_{k+1,1} & \dots & b_{k+1,k} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & b_{d,1} & \dots & b_{d,k} \end{array} \right| = 0$$

и, значит, первые  $k$  столбцов матрицы  $\mathbf{B}$  и последние  $d - k$  столбцов матрицы  $\mathbf{I}_{\mathbb{R}^{n-d}}$  линейно зависимы. Следовательно, соответствующие векторы  $\Psi$  тоже линейно зависимы, т.е. линейно зависимы векторы  $\psi_i$ , где  $i \in \{k + 1, k + 1, \dots, n - d + k\}$ .

## СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] S. F. D. Waldron, *An Introduction to Finite Tight Frames*, Birkhauser, Boston, 2018.
- [2] M. Fickus, J. Jasper, E. J. King, D. G. Mixon, “Equiangular tight frames that contain regular simplices”, *Linear Algebra Appl.*, **555** (2018), 98–138.
- [3] S. Ya. Novikov, “Equiangular tight frames with simplices and with full spark in  $\mathbb{R}^d$ ”, *Lobachevskii J. Math.*, **42**:1 (2021), 155–166.
- [4] O. Christensen, *An Introduction to Frames and Riesz Bases*, Birkhauser, Boston, 2002.
- [5] А. И. Мальцев, “Замечание к работе А. Н. Колмогорова, А. А. Петрова и Ю. М. Смирнова “Одна формула Гаусса из теории наименьших квадратов”, *Изв. АН СССР. Сер. матем.*, **11**:6 (1947), 567–568.
- [6] М. Н. Истомина, А. Б. Певный, “О расположении точек на сфере и фрейме Мерседес–Бенц”, Матем. просв., сер. 3, **11**, Изд-во МЦНМО, М., 2007, 105–112.
- [7] M. Elad, *Sparse and Redundant Representations*, Springer, New York, 2010.
- [8] A. Abdollahi, H. Najafi, “Frame graphs”, *Linear Multilinear Algebra*, **66**:6 (2018), 1229–1243.
- [9] M. Sustik, J. Tropp, I. Dhillon, R. Jr, “On the existence of equiangular tight frames”, *Linear Algebra Appl.*, **426**:2-3 (2007), 619–635.
- [10] C. Godsil, G. Royle, *Algebraic Graph Theory*, Grad. Texts in Math., **207**, Springer, New York, 2001.

**С. Я. Новиков**

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева  
*E-mail*: [nvks@ssau.ru](mailto:nvks@ssau.ru)

Поступило

24.02.2022

Принято к публикации

27.06.2022

**В. В. Севостьянова**

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева  
*E-mail*: [berlua@mail.ru](mailto:berlua@mail.ru)