



# Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

Ю. Н. Бибиков, Бифуркация устойчивых инвариантных торов из инвариантных торов меньшей размерности, *Дифференц. уравнения*, 1983, том 19, номер 2, 354–357

<https://www.mathnet.ru/de4778>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением <https://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 18.97.14.80

30 апреля 2025 г., 20:04:37



## КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 517.925.52

Ю. Н. БИБИКОВ

БИФУРКАЦИЯ УСТОЙЧИВЫХ ИНВАРИАНТНЫХ ТОРОВ  
ИЗ ИНВАРИАНТНЫХ ТОРОВ  
МЕНЬШЕЙ РАЗМЕРНОСТИ

Рассмотрим вещественную аналитическую систему дифференциальных уравнений, зависящих от малого многомерного параметра  $\varepsilon$ , имеющую аналитическое семейство  $m$ -мерных инвариантных торов  $\tau(\varepsilon)$ . Предположим, что существуют локальные координаты, в которых дифференциальные уравнения в окрестности  $\tau(\varepsilon)$  имеют вид

$$\dot{x} = A(\varepsilon)x + f(x, \varepsilon, \vartheta), \quad \dot{\vartheta} = \omega(\varepsilon) + g(x, \varepsilon, \vartheta), \quad (1)$$

где  $A(\varepsilon)$  — аналитическая при  $\|\varepsilon\| < \varepsilon_0$  (норма евклидова)  $2n \times 2n$ -матрица, собственные числа  $A(0)$  суть чисто мнимые, равные  $\pm i\lambda_1, \dots, \pm i\lambda_n$  ( $i = \sqrt{-1}$ ),  $\omega(\varepsilon)$  — аналитическая при  $\|\varepsilon\| < \varepsilon_0$   $m$ -мерная вектор-функция,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ ,  $g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  — аналитические  $2\pi$ -периодические по  $\vartheta$  функции,  $D = \{x, \varepsilon, \vartheta: \|x\| < x_0, \|\varepsilon\| < \varepsilon_0, \|\text{Im } \vartheta\| < \vartheta_0\}$ ,  $f(0, \varepsilon, \vartheta) = 0$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, \varepsilon, \vartheta) = 0$ ,  $g(0, \varepsilon, \vartheta) = 0$ .

Исходному семейству торов  $\tau(\varepsilon)$  в (1) соответствует семейство  $x(\varepsilon) = 0$ .

1°. Рассмотрим вопрос о существовании при  $\varepsilon \neq 0$  устойчивых инвариантных торов системы (1) размерности  $n + m$ . Случай  $n = 1$  рассматривался в [1] (при этом случай  $n = 1, m = 0, 1$  был исследован ранее, см. [2]). В дополнение к сделанным предположениям предположим также, что при  $m \geq 2$

1) справедливо неравенство

$$q_1\lambda_1 + \dots + q_n\lambda_n + p_1\omega_1(0) + \dots + p_m\omega_m(0) \neq 0, \quad (2)$$

где  $p_j, q_k$  — целые числа такие, что  $0 < \sum |p_j| < N$ ,  $0 < \sum |q_k| \leq 5$ ;

2) коэффициенты разложений  $f_k(g_k)$  по степеням  $x_j$  до порядка 4 (3) включительно являются как функции  $\vartheta$  конечными рядами Фурье (в этой работе всюду  $f_k$  обозначают координаты вектора  $f$ ).

При  $m = 1$  условие 2) излишне, а в условии 1) следует считать  $N = \infty$ . Тогда если  $N$  в (2) достаточно велико, то система (1) аналитически эквивалентна при достаточно малых  $\|\varepsilon\|$  своей нормальной форме [3] до членов порядка 5 в  $f$  и порядка 4 в  $g$ , т. е. системе

$$x_k = [\alpha_k(\varepsilon) + i\beta_k(\varepsilon)]x_k + x_k \sum_{s=1}^n a_{ks}(\varepsilon)x_s \bar{x}_s + X_k(x, \bar{x}, \varepsilon, \vartheta),$$

$$\dot{x}_k = [\alpha_k(\varepsilon) - i\beta_k(\varepsilon)]\bar{x}_k + \bar{x}_k \sum_{s=1}^n \bar{a}_{ks}(\varepsilon)x_s \bar{x}_s + \bar{X}_k, \quad (3)$$

$$\dot{\vartheta}_j = \omega_j(\varepsilon) + \sum_{s=1}^n A_{js}(\varepsilon)x_s \bar{x}_s + \Theta_j(x, \bar{x}, \varepsilon, \vartheta), \quad (k = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m),$$

где разложения  $X_k, \bar{X}_k, \Theta_j$  по степеням  $x_s, \bar{x}_s$  не содержат членов порядка ниже 5-го (4-го), их коэффициенты аналитичны при  $\|\varepsilon\| < \delta$ ,  $\|\text{Im } \vartheta\| < \vartheta_0$ , а  $\alpha_k, \beta_k, \omega_j, a_{ks}, A_{js}$  аналитичны по  $\varepsilon$  при  $\|\varepsilon\| < \delta$  и не зависят от  $\vartheta$ . При этом из условия вещественности следует, что вторые уравнения в системе (3) являются комплексно сопряженными по отношению к первым.

По условию  $\alpha(0) = 0$ ,  $\beta(0) = \lambda$ . Будем считать, что размерность  $\varepsilon$  не меньше  $n$ . Пусть

$$\text{rank } \frac{d\alpha}{d\varepsilon}(0) = n, \quad (4)$$

$$\det B(0) \neq 0, \quad (5)$$

где  $B(\varepsilon)$  — матрица с элементами  $\operatorname{Re} a_{ks}(\varepsilon)$  на пересечении  $k$ -ой строки и  $s$ -го столбца.

Перейдем в (3) к полярным координатам:  $x_k = \rho e^{i\varphi}$ ,  $\bar{x}_k = \rho e^{-i\varphi}$ . В результате получим вещественную систему

$$\begin{aligned} \rho_k &= \alpha_k(\varepsilon) \rho_k + \rho_k \sum_{s=1}^n b_{ks}(\varepsilon) \rho_s^2 + P_k(\rho, \varepsilon, \varphi, \theta), \\ \dot{\varphi}_k &= \beta_k(\varepsilon) + \sum_{s=1}^n c_{ks}(\varepsilon) \rho_s^2 + \rho_k^{-1} \Phi_k(\rho, \varepsilon, \varphi, \theta), \end{aligned} \quad (6)$$

$$\dot{\theta}_j = \omega_j(\varepsilon) + \sum_{s=1}^n A_{js}(\varepsilon) \rho_s^2 + \Theta_j(\rho, \varepsilon, \varphi, \theta), \quad (k=1, \dots, n; j=1, \dots, m),$$

где  $b_{ks} = \operatorname{Re} a_{ks}$ ,  $c_{ks} = \operatorname{Im} a_{ks}$ , функции  $P_k$ ,  $\Phi_k$ ,  $\Theta_j$  аналитичны при  $\|\rho\| < \rho_0$ ,  $\|\varepsilon\| < \delta$ ,  $\|\operatorname{Im} \varphi\| < \varphi_0$ ,  $\|\operatorname{Im} \theta\| < \theta_0$ , причем разложения  $P_k$ ,  $\Phi_k$  по степеням  $\rho_j$  не содержат членов порядка ниже 5-го, а разложения  $\Theta_j$  — ниже 4-го. Рассмотрим бифуркационное уравнение

$$\alpha(\varepsilon) + B(\varepsilon) \rho^2 = 0, \quad (7)$$

где  $\rho^2$  — вектор с координатами  $\rho_k^2$ . В силу (4) и (5) уравнение (7) имеет единственное решение  $\rho^2 = h(\varepsilon)$ ,  $h(0) = 0$ , причем

$$\operatorname{rank} \frac{dh}{d\varepsilon}(0) = \operatorname{rank} \left[ B^{-1}(0) \frac{d\alpha}{d\varepsilon}(0) \right] = n.$$

Пусть неравный нулю минор  $n$ -го порядка матрицы  $\frac{dh}{d\varepsilon}(0)$  образован первыми  $n$  координатами вектора  $\varepsilon$ . Положим  $\varepsilon = (\mu, \nu)$ , где  $\mu$  —  $n$ -мерный вектор. Не нарушая общности, можно принять  $h$  за  $n$ -мерную часть параметра, т. е. считать  $\mu = h$ . Будем предполагать, что параметр изменяется в области

$$\|\varepsilon\| < \delta, \quad d\|\mu\| < \sqrt{n} \mu_k \quad (0 < d < 1; k=1, \dots, n). \quad (8)$$

Введем переменные  $r_k$  по формулам  $\rho_k^2 = \sqrt{\mu_k} + \mu_k r_k$  ( $k=1, \dots, n$ ). Тогда система (6) примет вид

$$\dot{r} = P(\varepsilon) r + R(r, \varepsilon, y), \quad \dot{y} = \sigma(\varepsilon) + Q(\varepsilon) \mu + S(r, \varepsilon, y), \quad (9)$$

где  $y = \operatorname{col}(\varphi, \theta)$ ,  $\sigma = \operatorname{col}(\beta, \omega)$ ,  $P$  — матрица с элементами  $2b_{ks} \mu_k^{-1/2} \mu_s^{3/2}$ ,  $Q = \operatorname{col}(C, E)$ ,  $C$  — матрица с элементами  $c_{ks}$ ,  $E$  — матрица с элементами  $A_{ks}$ .

$$R = O(\|\mu\|^{3/2}), \quad S = O(\|\mu\|^{3/2}). \quad (10)$$

Правая часть (9) аналитична при  $\|\mu\| < 1$ ,  $\|\operatorname{Im} y\| < y_0$ , а по  $\varepsilon$  — в комплексной окрестности области (8).

Предположим, что собственные числа  $\lambda_k$  ( $k=1, \dots, n$ ) матрицы  $B(0)$  имеют отрицательные вещественные части и пусть  $-e$  — наибольшая из них. В  $\varepsilon$  зафиксируем  $\nu$  и положим  $\mu_j = z_j \mu_1$  ( $z_j > 0$ ;  $j=2, \dots, n$ ). Тогда собственные числа  $\gamma_k(\mu)$  матрицы  $P(\mu)$  имеют вид

$$\gamma_k = \mu_1 q_k(z_2, \dots, z_n), \quad (11)$$

где  $q_k \rightarrow 2\lambda_k$  при  $z_j \rightarrow 1$  ( $j=2, \dots, n$ ). Если  $z_j$  достаточно близки к единице, то в силу (11)

$$\operatorname{Re} \gamma_k(\mu) < -e \mu_1 < -\frac{ed}{\sqrt{n}} \|\mu\|. \quad (12)$$

Этого можно добиться, выбрав  $d$  в (8) достаточно близким к единице.

При указанных значениях параметра к системе (9) можно применить теорему Дж. Хейла ([4], теорема 15.1) о существовании инвариантной тороидальной поверхности вида  $r = F(y, \varepsilon)$ , где  $F$  — сколь угодно гладкая функция,  $2\pi$ -периодическая по  $y$ . Хотя в указанной теореме  $\varepsilon$  считался одномерным параметром, доказательство ее сохраняет силу вследствие (10) и (12). Отсюда вытекает

**Теорема 1.** Если  $\delta$  и  $1-d$  достаточно малы, выполняется условие (4) и собственные числа  $B(0)$  имеют отрицательные вещественные части, то каждому  $\varepsilon$  из области (8) соответствует асимптотически устойчивый инвариантный тор  $T(\varepsilon): \rho_k = \sqrt{\mu_k} + \mu_k F_k(y, \varepsilon)$  ( $k=1, \dots, n$ ) системы (6).

**Замечание.** Условие аналитичности исходной системы можно ослабить до условия Липшица (см. [4]).

2°. Теперь рассмотрим вопрос, при каких условиях тор  $T(\varepsilon)$  является носителем квазипериодических решений с  $n + m$  базисными частотами. Установим размерность параметра  $\varepsilon$  равной  $n + m$ . Вместо системы (9) рассмотрим систему

$$\dot{r} = Pr + R, \quad \dot{y} = \Omega + \Delta + S, \quad (13)$$

где  $\Omega$  —  $n + m$ -мерный постоянный вектор, координаты которого удовлетворяют условию

$$|k_1\Omega_1 + \dots + k_{n+m}\Omega_{n+m}| > K \|\mu\| (|k_1| + \dots + |k_{n+m}|)^{-(n+m+1)}, \quad (14)$$

где  $K > 0$  не зависит от  $\mu$ ,  $\sum k_j > 0$ ,  $k_j$  целые.

Правые части системы (9) и (13) аналитичны по  $\varepsilon$  в области

$$|\varepsilon| < \delta, \quad |\operatorname{Im} \mu_k| < \eta \operatorname{Re} \mu_k \quad (15)$$

при любом  $\eta > 0$ . К системе (13) применим теорему Н. Н. Боголюбова о существовании квазипериодических решений ([5], теорема 3). Согласно этой теореме, если  $\delta$  достаточно мало, существует  $n + m$ -мерная векторная функция  $\Delta(\varepsilon)$  такая, что система (13) имеет квазипериодические решения

$$r = u(\bar{y} + \Omega t, \varepsilon), \quad y = \bar{y} + \Omega t + v(\bar{y} + \Omega t, \varepsilon), \quad (16)$$

где  $u(y, \varepsilon)$ ,  $v(y, \varepsilon)$  —  $2\pi$ -Периодические функции  $y$ , аналитические по  $y$  при  $\|\operatorname{Im} y\| < y^*$ ,  $y$  — произвольный постоянный вектор. При этом в силу (10)

$$\Delta(\varepsilon) = O(\|\mu\|^{3/2}). \quad (17)$$

Далее, можно показать ([5], § 5), что  $u$ ,  $v$ ,  $\Delta$  являются аналитическими функциями  $\varepsilon$  в области, где аналитична система (13) и выполняется неравенство

$$\|e^{Pt}\| \leq H e^{-\alpha \|t\|}, \quad \alpha > 0, \quad H > 0.$$

Из (11) вытекает, что эти условия выполняются, когда  $\varepsilon$  изменяется в области (15) при достаточно малом  $\eta > 0$ , если  $z_j$  в (11) достаточно близки к единице. В частности,  $\Delta(\varepsilon)$  непрерывно дифференцируема в вещественной области (8), причем из оценок Коши и из (17) следует, что там

$$\frac{d\Delta}{d\varepsilon} = O(\|\mu\|^{1/2}). \quad (18)$$

Обозначим через  $\mathfrak{M}(\delta)$  область, представляющую собой образ области (8) при отображении  $\varepsilon \rightarrow \sigma(\varepsilon) + Q(\varepsilon)\mu - \Delta(\varepsilon)$ . В силу (18) при выполнении условия

$$\det \left[ \frac{d\sigma}{d\varepsilon}(0) + (Q(0), \bar{0}) \right] \neq 0, \quad (19)$$

где  $\bar{0}$  — нулевая  $n + m \times m$ -матрица, мера  $\mathfrak{M}(\delta)$  имеет порядок  $\delta^{n+m}$ . Выбором достаточно малого  $K > 0$ , не зависящего от  $\delta$ , можно добиться, чтобы множество точек  $\mathfrak{N}(\delta) \subset \mathfrak{M}(\delta)$ , удовлетворяющих условию (14) при  $\|\mu\| = \delta$ , было непусто и его мера была бы сколь угодно близка к мере  $\mathfrak{M}(\delta)$ . Так как  $\delta \geq \|\varepsilon\| \geq \|\mu\|$ , то для точек  $\mathfrak{N}(\delta)$  выполняется и (14). Рассмотрим уравнение

$$\Omega + \Delta = \sigma + Q\mu, \quad \Omega \in \mathfrak{N}(\delta). \quad (20)$$

При условии (19) уравнение (20) имеет решение  $\varepsilon(\Omega)$ , определенное при  $\Omega \in \mathfrak{N}(\delta)$ , причем  $\varepsilon(\Omega) \rightarrow 0$  при  $\Omega \rightarrow (\lambda, \omega(0))$ . Поскольку при выполнении (20) системы (13) и (9) совпадают, из вышеизложенного вытекает

**Теорема 2.** Если  $\delta$  и  $1 - d$  в (8) достаточно малы, выполнены условия (4) и (19) и собственные числа матрицы  $B(0)$  имеют отрицательные вещественные части, то каждому  $\varepsilon(\Omega)$ , где  $\Omega \in \mathfrak{N}(\delta)$ , соответствует асимптотически устойчивый инвариантный тор системы (6) с квазипериодическими решениями (16):  $\rho_h = \sqrt{\mu_h} + \mu_h u_h(\bar{y} + \Omega t, \varepsilon)$ ,  $y_j = \bar{y}_j + \Omega_j t + v_j(\bar{y} + \Omega t, \varepsilon)$ .

При  $m = 0$  это утверждение доказано в [6].

## Литература

1. Sell G. R. Bifurcation of Higher Dimensional Tori.— Archive for Rational Mechanics and Analysis, 1979, vol. 69, N 3, p. 199—230.
2. Арнольд В. И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений.— М.: Наука, 1978, с. 304.
3. Брюно А. Д. Локальный метод нелинейного анализа дифференциальных уравнений.— М.: Наука, 1979, с. 253.
4. Хейл Д. ж. Колебания в нелинейных системах.— М.: Мир, 1966, с. 230.
5. Боголюбов Н. Н., Митропольский Ю. А., Самойленко А. М. Ме-

тод ускоренной сходимости в нелинейной механике.— Киев: Наукова думка, 1969, с. 247.

6. Библиков Ю. Н.— Дифференц. уравнения, 1980, т. 16, № 9, с. 1539—1544.

Ленинградский государственный университет  
им. А. А. Жданова

Поступила в редакцию  
15 июля 1980 г.

УДК 517.929

П. С. ГРОМОВА

## ОБ ОБРАЩЕНИИ ТЕОРЕМ Б. С. РАЗУМИХИНА

Долгое время рядом авторов [1—4] высказывалось утверждение о необратимости теорем второго метода Ляпунова для систем с отклоняющимся аргументом в классе функций конечного числа переменных и, в частности, теорем Б. С. Разумихина [1]. В основе этих высказываний лежали следующие рассуждения: если бы эти теоремы допускали обращение, то для уравнений вида  $x'(t) = f(t, x(t), x(t-\tau))$  и  $x'(t) = kf(t, x(t), x(t-\tau))$ ,  $\tau = \text{const}$  при любых положительных  $k$  устойчивость или неустойчивость должна была бы иметь место одновременно, так как если тривиальное решение первого уравнения устойчиво, то в силу теоремы обращения это уравнение должно иметь функцию Ляпунова  $v(t, x)$ , а тогда для второго уравнения в качестве функции Ляпунова можно взять  $v(kt, x)$ .

На простейших примерах линейных уравнений с постоянными коэффициентами и постоянным запаздыванием показывалось, что области устойчивости таких уравнений не совпадают. Отсюда делался вывод о невозможности обращения теорем Ляпунова для систем с отклоняющимся аргументом в классе функций конечного числа переменных. В этих рассуждениях не был учтен тот факт, что при переходе от первого из приведенных выше уравнений ко второму вместе с переходом от переменной  $t$  к переменной  $kt$  происходит соответствующее растяжение или сжатие запаздывания во втором уравнении в  $k$  раз. Поскольку для уравнений с отклоняющимся аргументом область устойчивости, как правило, зависит от величины запаздывания, то приводимые в [2—4] примеры не противоречат возможности обращения теорем Ляпунова для уравнений с отклоняющимся аргументом в классе функций конечного числа переменных. Теоремы обращения в случае равномерной асимптотической устойчивости в классе функционалов доказаны в [4]. В данной заметке приводится теорема о существовании функции Ляпунова для систем с запаздыванием в случае асимптотической устойчивости, равномерной по начальным данным.

Рассмотрим систему

$$x'(t) = F(t, x(t), x(t-\tau(t))), \quad (1)$$

где  $x(t) \in R^n$  при каждом фиксированном  $t$ ,  $\tau(t)$  — непрерывная функция  $0 \leq \tau(t) \leq h = \text{const}$ , векторная функция  $F(t, x, y)$  определена и непрерывна по  $t$  в области

$$|x(t)| < H, \quad t \geq t_0, \quad (2)$$

удовлетворяет в этой области условию Липшица по переменным  $x$  и  $y$  и  $F(t, 0, 0) = 0$ . Здесь и в дальнейшем  $|x(t)|$  — евклидова норма.

Рассмотрим решение системы (1)  $x(t) = x(t, \varphi, t_0)$ , удовлетворяющее начальным условиям  $x(t) = \varphi(t)$ ,  $t \in E_{t_0} = [t_0 - \tau, t_0]$ ,  $\tau = \sup\{\tau(t) - t + t_0, t \geq t_0\}$ ,  $\varphi(t) \in C(E_{t_0})$ . Будем говорить, что тривиальное решение системы (1) асимптотически устойчиво равномерно по начальному моменту  $t_0 \geq 0$  и по начальным функциям из области

$$|\varphi(t)| < \delta, \quad t \in E_{t_0}, \quad (3)$$

(равномерно по начальным данным), если оно равномерно устойчиво по  $t_0$  и если для любого  $\alpha > 0$  существует  $T(\alpha) > 0$  такое, что для всех  $t \geq t_0 + T$  и всех  $\varphi(t)$  из области (3) справедливо неравенство  $|x(t)| < \alpha$ . Будем рассматривать вещественные функции  $v(t, x)$ , определенные и непрерывные в области (2). Обозначим через  $Dv(t, x)$  верхнее правое производное число функции  $v(t, x)$  на решениях системы (1)

$$Dv(t, x) = \limsup_{\Delta t \rightarrow +0} \frac{1}{\Delta t} [v(t + \Delta t, x(t + \Delta t, \varphi, t_0)) - v(t, x(t, \varphi, t_0))].$$

**Теорема.** Для асимптотической устойчивости тривиального решения системы (1), равномерной по начальным данным, необходимо и достаточно, чтобы в области (2) существовала определенно положительная, допускающая бесконечно малый высший предел функция  $v(t, x)$ , для которой функционал  $Dv(t, x)$  определенно отрицателен на множествах решений системы (1), удовлетворяющих условию

$$v(x(\sigma), \sigma) \leq v(x(t), t), \quad \sigma \leq t, \quad t \geq t_0. \quad (4)$$