

3. Гашков С. Б. О глубине булевых функций//Проблемы кибернетики. Вып. 34. М., 1978. 265—268.
4. Ложкин С. А. О глубине функций алгебры логики в некоторых базисах//Апп. Univ. Sci. budapest. Sec. Comput. 1983. IV. 113—125.
5. Лупанов О. Б. О сложности универсальной параллельно-последовательной сети глубины 3//Тр. Матем. ин-та АН СССР. 1973. 133. 127—131.
6. Ложкин С. А. О синтезе ориентированных контактных схем//Вестн. Моск. ун-та. Вычисл. матем. и кибернетика. 1995. № 2. 36—42.

Поступила в редакцию
16.06.95

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 1, МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. 1996. № 2

УДК 517.51

М. П. Королева

ОБ ОДНОМ ОБОБЩЕНИИ ИНТЕГРАЛА ПЕРРОНА

В работе [1] В. А. Скворцов построил интеграл перроновского типа, соответствующий производной относительно последовательностей двоичных сетей и позволяющий вычислять коэффициенты всюду сходящихся рядов Хаара или Уолша как коэффициенты Фурье их сумм. Он же показал (см. [2]), что примитивная в смысле этого интеграла не обладает N -свойством Лузина. Е. С. Байгожин в [3] сузил этот интеграл: решая ту же задачу о вычислении коэффициентов, интеграл в то же время обладает N -свойством Лузина.

Аналогичные вопросы возникают в связи с построением интегралов, позволяющих вычислять коэффициенты сходящихся рядов по мультипликативным системам, обобщающим систему Уолша. При этом вместо двоичных используются P -ичные сети. Соответствующий перроновский интеграл, базирующийся на понятии производной относительно последовательностей P -ичных сетей (см. [4]), как и в двоичном случае, не обладает N -свойством. Более того, можно показать, что этот интеграл не обладает N -свойством даже в случае, когда подынтегральная функция в каждой точке является конечной производной относительно последовательностей P -ичных сетей от своего интеграла.

В данной заметке дается более узкое определение P -ичной производной и вводится соответствующий этой производной более узкий P -ичный интеграл, который, решая задачу вычисления коэффициентов для рядов по мультипликативной системе, обладает N -свойством на классе точных P -ичных производных.

Естественной областью определения мультипликативных систем является P -ичная группа, т. е. группа $G(P)$ целочисленных последовательностей $\{x_j\}_{j=1}^{\infty}$, $0 \leq x_j \leq p_j - 1$, где $P = \{p_j\}_{j=1}^{\infty}$ — заданная последовательность натуральных чисел, $p_j \geq 2$ при всех $j \geq 1$, с групповой операцией \oplus , определяемой как покоординатное сложение по модулю p_j для j -й координаты. Если x_j истолковывать как j -й коэффициент P -ичного разложения некоторого числа из отрезка $[0, 1]$, то мы придём к геометрической модели группы $G(P)$ в виде «модифицированного» отрезка $[0, 1]_{P}^*$, в котором каждая P -ично-рациональная точка «раздваивается», соответствуя двум своим различным P -ичным раз-

ложениям. Отображение $\lambda_P: x \rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x_j}{m_j}$, где $m_j = p_1 p_2 \dots p_j$, переводит

группу $G(P)$ в отрезок $[0, 1]$. Величина $\rho(x, y) = \min\{\lambda_P(x \ominus y), \lambda_P(y \ominus x)\}$, где \ominus — операция, обратная к \oplus , играет роль расстояния в группе $G(P)$ или, что то же, в $[0, 1]_P^*$, превращая ее в метрическое пространство. Две различные точки из $[0, 1]_P^*$, которые при отображении λ_P переходят в одну и ту же P -ично-рациональную точку отрезка $[0, 1]$, назовем λ -эквивалентными.

Рассмотрим в $[0, 1]_P^*$ «отрезки» $\Delta^{(k)}(x)$ — замыкания прообразов при отображении λ_P интервалов $\left(\frac{r}{m_k}, \frac{r+1}{m_k}\right)$, содержащие $x \in [0, 1]_P^*$. Обозначим через $a_k(x)$ и $b_k(x)$ соответственно левый и правый концы отрезка $\Delta^{(k)}(x)$, а через Q^- и Q^+ — множества точек $[0, 1]_P^*$, являющихся соответственно левым и правым концами некоторого отрезка $\Delta_r^{(k)}$. Кроме того, пусть $Q = Q^- \cup Q^+$ и $I = [0, 1]_P^* \setminus Q$.

Определение 1. Назовем функцию $F(x)$, определенную на $[0, 1]_P^*$, Q -непрерывной в точке $x \in [0, 1]_P^*$, если

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F(a_k(x)) = F(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} F(b_k(x)).$$

Определение 2. Функцию $F(x)$ назовем Q -дифференцируемой в точке $x \in [0, 1]_P^*$, если существуют и равны пределы

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{F(x) - F(a_k(x))}{\lambda_P(x) - \lambda_P(a_k(x))} \quad \text{и} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{F(b_k(x)) - F(x)}{\lambda_P(b_k(x)) - \lambda_P(x)}, \quad (1)$$

причем в точках множества Q^- требуем существования только первого предела, а в точках множества Q^+ — второго.

Производную $F(x)$ в точке x обозначим через $D_Q F(x)$.

Пределы по подпоследовательностям натуральных чисел в выражениях (1) назовем Q -производными числами. Тем самым, в частности, будут определены нижнее $\underline{D}_Q F(x)$ и верхнее $\overline{D}_Q F(x)$ Q -производные числа функции $F(x)$ в точке x .

Определение 3. Q -непрерывную на $[0, 1]_P^*$ функцию $U(x)$ ($V(x)$), значения которой в λ_P -эквивалентных точках совпадают, назовем \mathcal{P}_Q -мажорантой (\mathcal{P}_Q -минорантой) функции $f(x)$ на $[0, 1]_P^*$, если $U(0) = 0$ ($V(0) = 0$) и $-\infty \neq \underline{D}_Q U(x) \geq f(x)$ ($+\infty \neq \overline{D}_Q V(x) \leq f(x)$) для всех $x \in [0, 1]_P^*$.

Лемма. Если функция $F(x)$, определенная на $[0, 1]_P^*$ и принимающая равные значения в λ_P -эквивалентных точках, при всех $x \in [0, 1]_P^*$ удовлетворяет условию $\underline{D}_Q F(x) \geq 0$, то $F(x)$ не убывает на $[0, 1]_P^*$.

Определение 4. Будем говорить, что функция $f(x)$ \mathcal{P}_Q -интегрируема на $[0, 1]_P^*$, если $\inf\{U(1) : U(x) - \mathcal{P}_Q\text{-мажоранта } f(x)\} = \sup\{V(1) : V(x) - \mathcal{P}_Q\text{-миноранта } f(x)\}$. Их общее значение назовем определенным \mathcal{P}_Q -интегралом от $f(x)$ по $[0, 1]_P^*$ и обозначим $(\mathcal{P}_Q) \int_0^1 f(x) dx$.

Корректность этого определения следует из леммы, так как разность $U(x) - V(x)$ не убывает на $[0, 1]_P^*$, и в частности $U(1) \geq V(1)$.

Кроме того, в силу монотонности $U(x) - V(x)$ определяется и неопределенный \mathcal{P}_Q -интеграл $P(x)$, равный $\inf U(x) = \sup V(x)$.

Несложно доказать, что введенный интеграл обладает всеми основными свойствами интегралов, в том числе неопределенный \mathcal{P}_Q -интеграл Q -непрерывен и почти всюду (в смысле меры Хаара на группе $[0, 1]_P^*$) Q -дифференцируем на $[0, 1]_P^*$.

Определение 5. Назовем $F(x)$ функцией класса $AC(E)$ ($F(x) \in AC(E)$), где $E \subset [0, 1]_p^*$, если для произвольного числа $\varepsilon > 0$ найдется $\eta > 0$, такое, что для любой конечной системы $\{[\alpha_k, \beta_k]_p^*\}_{k=1}^n$ неперекрывающихся отрезков с концами в E из неравенства

$$\sum_{k=1}^n (\lambda_p(\beta_k) - \lambda_p(\alpha_k)) < \eta$$

следует неравенство

$$\sum_{k=1}^n |F(\beta_k) - F(\alpha_k)| < \varepsilon.$$

Теорема 1. Пусть последовательность $\{p_j\}_{j=1}^\infty$ ограничена и функция $F(x)$, принимающая равные значения в λ_p -эквивалентных точках, всюду на некотором множестве $A \subset [0, 1]_p^*$ удовлетворяет неравенствам

$$-\infty < \underline{D}_Q F(x) \leq \bar{D}_Q F(x) < +\infty.$$

Тогда $A = \bigcup_n A_n$, так что $F(x) \in AC(A_n)$, $n = 1, 2, \dots$

В условиях теоремы 1 функция $F(x)$ обладает N -свойством Лузина. В частности, если f является точной Q -производной некоторой функции $F(x)$, то ее неопределенный \mathcal{P}_Q -интеграл обладает N -свойством. Вопрос о том, обладает ли N -свойством \mathcal{P}_Q -интеграл в общем случае, остается открытым.

Введенный интеграл позволяет решить задачу вычисления коэффициентов всюду сходящихся рядов по мультипликативной системе Прайса. А именно справедлива следующая

Теорема 2. Пусть ряд $\sum_{n=1}^\infty a_n \chi_n(x)$ по мультипликативной системе Прайса, определяемой ограниченной последовательностью P , сходится всюду на $[0, 1]_p^*$ к конечной функции $f(x)$. Тогда $f(x)$ \mathcal{P}_Q -интегрируема на $[0, 1]_p^*$ и

$$a_n = (\mathcal{P}_Q) \int_0^1 f(x) \overline{\chi_n(x)} dx.$$

Аналогичная теорема справедлива и для системы типа Хаара.

Автор выражает благодарность профессору В. А. Скворцову за постановку задачи и постоянное внимание к работе.

Работа поддержана РФФИ, проект № 94-01-00417.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Скворцов В. А. О рядах Хаара, сходящихся по подпоследовательностям частичных сумм//Докл. АН СССР. 1968. 183, № 4. 784—786.
2. Skvortsov V. A. Some properties of dyadic primitives//Lect. Notes Math. 1988. 1419. 167—179.
3. Байгожин Е. С. Обобщенные интегралы и задача восстановления коэффициентов некоторых всюду сходящихся ортогональных рядов: Канд. дис. М., 1992.
4. Skvortsov V. A. A Perron type integral in an abstract space//Real Analysis exchange. 1989. 13, N 1. 76—79.

Поступила в редакцию
12.10.94